



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Assessorato ai Trasporti a Fune
Segreteria Regionale per le Infrastrutture
Direzione Mobilità

PIANO REGIONALE NEVE

**VALUTAZIONE DI
INCIDENZA AMBIENTALE**

Parte III

Valutazione di incidenza appropriata

- A.04 Monte Ferro -

ALLEGATO F

n.12/31 Demani

Assessorato ai Trasporti a Fune
Segreteria Regionale per le Infrastrutture
Direzione Mobilità

Consulente per la procedura di V.A.S.:

Studio Program s.r.l.
Progettazione e gestione delle risorse ambientali
Energia e Fonti Rinnovabili



INDICE

VALUTAZIONE APPROPRIATA: PREMESSA.....	3
FASE 1: SOLUZIONE ALTERNATIVA ZERO.....	5
FASE 2: SOLUZIONE ALTERNATIVA ZERO.....	7
FASE 1: SOLUZIONE ALTERNATIVA UNO.....	8
FASE 2: SOLUZIONE ALTERNATIVA UNO.....	9
FASE 1: SOLUZIONE ALTERNATIVA DUE.....	12
FASE 2: SOLUZIONE ALTERNATIVA DUE.....	18
2.1) Aree interessate e caratteristiche dimensionali.....	18
2.2) Durata dell'attuazione e cronoprogramma.....	21
2.3) Individuazione dei siti della rete Natura 2000 e dagli elementi chiave di questi.....	22
2.4) Indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione.....	23
2.5) Individuazione dei possibili effetti del Piano.....	24
2.6) Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire congiuntamente.....	27
FASE 3: SOLUZIONE ALTERNATIVA DUE.....	28
3.1) Definizione dei limiti spaziali e temporali dell'analisi.....	28
3.2) Identificazione dei siti della rete Natura 2000 interessati e descrizione.....	30
3.3) Identificazione degli aspetti vulnerabili dei siti considerati.....	55
3.4) Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie.....	66
3.5) Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi.....	67
3.6) Identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali gli effetti si possono produrre.....	67
3.7) Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie.....	68
FASE 4: SOLUZIONE ALTERNATIVA DUE.....	85



VALUTAZIONE APPROPRIATA: PREMESSA

In questa fase si valuta se il PIANO REGIONALE NEVE, in seguito all'attuazione di soluzioni alternative misure di mitigazione e/o compensazione, possa avere un incidenza negativa sull'integrità dei siti Natura 2000 singolarmente e congiuntamente ad altri progetti o piani. La valutazione dell'impatto sull'integrità dei siti viene effettuata in riferimento agli obiettivi di conservazione, alla struttura e alla funzionalità del siti all'interno della rete Natura 2000.

Nel luglio 2007 la Valutazione di Incidenza Preliminare (in fase di Screening) al “PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SETTORE IMPIANTISTICO DELLO SCI ALPINO E DA FONDO” per l'area sciabile di Monte Ferro non è stato possibile escludere con ragionevole certezza scientifica la sussistenza di possibili effetti significativamente negativi sui siti della rete Natura 2000. Per l'area sciabile di Monte Ferro si è ritenuto quindi necessario procedere con la Valutazione Appropriata affinché si possa verificare se le possibili soluzioni alternative e/o le misure di mitigazione/compensazione siano sufficienti ad escludere gli effetti negativi del piano sullo stato di conservazione dei siti della rete Natura 2000.

Nel Novembre 2009 la Direzione Mobilità della Regione Veneto ha adottato un nuovo piano, definito PIANO REGIONALE NEVE, il quale, ai fini della seguente Valutazione di Incidenza Ambientale rappresenta la soluzione alternativa al “PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SETTORE IMPIANTISTICO DELLO SCI ALPINO E DA FONDO” del luglio 2007. La soluzione alternativa prospettata (“PIANO REGIONALE NEVE” con DGR adottato nel Novembre 2009) definisce per ciascuna demanio: un AMBITO SCIISTICO precisamente cartografato e delimitato, NORME TECNICHE e NORME DI INTERVENTO AMBIENTALE. Il dettaglio di ciascun provvedimento preso con questo piano verrà precisato in seguito.

Nel caso in cui anche con l'adozione del “PIANO REGIONALE NEVE” (post 2007) per l'ambito sciistico-demaniale di Monte Ferro non si possa escludere con ragionevole certezza scientifica la sussistenza di possibili effetti significativamente negativi sui siti della rete Natura 2000, si dovrà verificare altre possibili soluzioni alternative.



Nel seguente documento verranno analizzate le seguenti tre soluzioni alternative:

- **Soluzione zero:** Attuale pianificazione territoriale nell'area in esame (Piano Regolatore Comunale e altri Piani a scala territoriale diversa)
- **Soluzione uno:** Piano degli interventi del 2007 (Piano pre – adottato)
- **Soluzione due:** Piano Regionale Neve (Piano Contro dedotto, post 2007)

Attraverso questa analisi, sempre più mirata, degli effetti ambientali, si arriva a definire la sussistenza e la maggiore o minore significatività dell'incidenza sull'integrità del sito. La valutazione viene svolta in base al principio di precauzione per cui se non si può escludere che vi siano effetti negativi si procede presumendo che vi saranno.

È opportuno sottolineare che le misure di mitigazione sono concettualmente diverse dalle misure di compensazione, anche se le misure di mitigazione ben realizzate limitano la portata delle misure compensative necessarie, in quanto riducono gli effetti negativi che necessitano di compensazione. In effetti, le misure di mitigazione hanno lo scopo di ridurre al minimo o addirittura eliminare gli effetti negativi di un piano durante o dopo la sua realizzazione.

Le misure di compensazione, invece, sono volte a garantire la continuità del contributo funzionale di un sito alla conservazione in uno stato soddisfacente di uno o più habitat o specie nella regione biogeografica interessata.

Le misure di mitigazione possono riguardare, ad esempio:

- tempi di realizzazione (ad es. divieto di interventi durante il periodo di evoluzione di un habitat o di riproduzione di una specie);
- tipologia degli strumenti e degli interventi da realizzare;
- individuazione di zone rigorosamente non accessibili all'interno di un sito.



FASE 1: SOLUZIONE ALTERNATIVA ZERO

Sono stati esaminati le interrelazioni tra le attività sciistiche che interessano l'area di Monte Ferro con gli strumenti di pianificazione territoriale che interessano specificatamente l'area in esame, che sono i seguenti:

- a) PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI SAPPADA. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

a) Piano regolatore generale del comune di Sappada. Norme Tecniche di Attuazione

Le norme tecniche di attuazione del P.R.G. del comune di Sappada disciplinano le attività e la realizzazione di impianti per la pratica dello sci come di riportato:

7 SPORT INVERNALI

7.1 - Sci - Attrezzature di servizio

Gli edifici e le attrezzature esistenti ed individuate con apposita grafia nella tavola di PRG sono destinate a funzioni di supporto delle strutture sciistiche esistenti o di progetto.

Sono ammessi interventi in diretta attuazione del PRG a mezzo di semplice concessione edilizia, con la seguente destinazione d'uso:

A- destinazione mista terziario impianti

B- ristoro piste e campetti

C- edifici per lo svago e il divertimento, attività ricreative, attività turistico ricettive.

Le costruzioni non devono superare i seguenti parametri:

- a) indice di copertura: mq/mq 0,30
- b) altezza massima: ml 7,50
- c) distanze minime:
 - dalla strada: ml 10,00 o su allineamento preesistente
 - dai confini fondiari: ml 5,00 o al confine
 - dagli altri fabbricati: ml 10,00 o in aderenza. (vedi criteri di misurazione – Allegato 1 al regolamento edilizio comunale)



Gli interventi di nuova edificazione, nel rispetto della destinazione di zona, sono soggetti a previa approvazione di un piano urbanistico attuativo, con indicazioni planovolumetriche, che preveda la dotazione di aree per servizi a standard nella misura prevista dalla vigente legislazione in materia; in esso debbono essere analiticamente indicate le aree riservate alle opere di urbanizzazione.

* *Emendamento n° 2:* Stralciato: “Nel contesto della progettazione è consentita all’attività esercitata” (*Dovrà essere puntualmente ristudiato*)

Qualora si rendesse opportuno lo spostamento, all'interno dell'ambito, di una o più costruzioni accessorie minori esistenti (quali biglietterie, cabine per il cronometraggio, ecc.), autorizzate o regolarmente assentite, l'intervento non è soggetto a concessione o autorizzazione ma solo a preventiva comunicazione al Comune.

7.2 - Piste ed impianti di risalita

E' vietata l'edificazione.

Sono ammessi esclusivamente i fabbricati di servizio degli impianti.

I tracciati degli impianti di risalita e loro variazioni, debbono essere motivati dal punto di vista tecnico-impiantistico e definite entro un piano attuativo.

Qualora si rendesse opportuno lo spostamento, all’interno dell’ambito, di una o più costruzioni accessorie minori esistenti (quali biglietterie, cabine per il cronometraggio, ecc.) autorizzate o regolarmente assentite, l’intervento non è soggetto a Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività, ma solo a preventiva comunicazione al Comune.

All’interno di tale area rientra anche la situazione del demanio sciabile del Monte Ferro, all’interno del quale erano state approvate nuove previsioni urbanistiche con una variante ai sensi della L. R. 21/98.

In sede di attuazione degli interventi – Collegamento impianti Sappada 2.000 e Monte Siera, vengano mantenute le dovute distanze di rispetto dal fiume Piave e vengano effettuate puntuali e preventive verifiche geologiche di cui al D.M. 11 marzo 1988;

7.3 - Ambiti per la pratica dello sci nordico

Gli ambiti, evidenziati con apposita grafia nelle tavole di PRG, sono destinati alla pratica invernale dello sci nordico.

In tali ambiti sono fatte salve le normative della ZTO di riferimento; per quanto è possibile è da evitare la creazione di strutture che ne ostacolano l'attività.



- *area attrezzabile a stadio del fondo*

Tale ambito è riservata alla creazione dello "stadio del fondo".

Gli interventi sono subordinati alla redazione di un piano particolareggiato che individui l'area destinata alla creazione delle sottoinfrastrutturazioni necessarie e quella per la pratica agonistica, con particolare attenzione all'impatto paesaggistico ed ambientale delle opere fisse.

FASE 2: SOLUZIONE ALTERNATIVA ZERO

L'area sciistica di Monte Ferro ricade nei seguenti siti Natura 2000:

– **ZPS IT3230089**

Nome Sito: **Dolomiti del Cadore e Comelico**

Nell'area in esame sono inoltre presenti degli habitat comunitari i quali potrebbero essere direttamente e/o indirettamente coinvolti dalle attività sciistiche praticate nell'area di Monte Ferro.

Esaminato le prescrizioni date dagli strumenti di pianificazione territoriale (PRG del comune di Sappada), considerato la presenza nell'area in esame di siti Natura 2000 e in particolare di habitat comunitari, si ritiene possibile procedere con una valutazione semplice e pragmatica ma spesso ritenuta esaustiva (Glasson, 1999).

Valutando le informazioni acquisite per la soluzione alternativa zero, ovvero le interrelazioni tra le attività sciistiche che interessano l'area di Monte Ferro con gli strumenti di pianificazione territoriale che interessano specificatamente l'area in esame, si attesta che effetti significativi negativi sono possibili sui siti della rete Natura 2000.

FASE 1: SOLUZIONE ALTERNATIVA UNO

Si riporta quanto scritto nella Valutazione di Incidenza Preliminare al Piano degli Interventi per l'area sciabile di Monte Ferro.

Area turistica	Sappada
Area sciabile	Sappada 2000 – Monte Ferro
Subarea	Monte Ferro
Comune	Sappada (BL)



È previsto l'aggiornamento delle due sciovie Filomena e Sasso Alto con portate coerenti agli standard attuali ed il conseguente aumento di potenza. Non è previsto aumento di impianti.

Sup. Pista (ha)	24,34 (Q_{min}=1.233 – Q_{max}=1.852 m s.l.m.)
Numero impianti esistenti	5
Numero impianti obsoleti	2
Aumento numero impianti ?	NO
Portata attuale (sciat/h)	3.825
Potenza attuale (sciat x km/h)	1.172
Aumento di potenza ?	SI (Limite potenza futura = 1.500 sciat x km/h)
Incremento teorico di superficie parcheggio conseguente ad aumento potenza (mq)	2.778
Tipologia interventi complessivi previsti	Ammodernamento/potenziamento
Ampliamento area sciabile ?	SI



Nome ampliamento/i	A04.Amp2 A04.Amp3
Collegamenti con altre aree ?	NO
Nome collegamento/i	-
Ampliamento A04.Amp2	Monte della Piana
Ampliamento finalizzato ad aumentare la ricettività e l'attrattiva della zona dei laghi d'Olbe la cui consistenza attualmente non giustifica i costi di esercizio dell'impianto di apporto. È prevista la costruzione di un piccolo impianto a fune con relativa pista da sci con dislivello di circa 200 m.	
Numero impianti ampliamento	0
Superficie teorica di parcheggio a servizio dell'ampliamento (mq)	1.000
Necessità di nuovo accesso all'area	NO
Ampliamento A04.Amp3	Monte Ferro 1
Ampliamento finalizzato alla costruzione di una pista a maggiore pendenza e rientro facilitato alla partenza della seggiovia Sappada Miravalle.	
Numero impianti ampliamento	0
Superficie teorica di parcheggio a servizio dell'ampliamento (mq)	0
Necessità di nuovo accesso all'area	NO

FASE 2: SOLUZIONE ALTERNATIVA UNO

Si riporta quanto scritto nella Valutazione di Incidenza Preliminare al Piano degli Interventi per l'area sciabile di Monte Ferro.

PROVINCIA BELLUNO Area sciistica di Sappada	Area sciabile Sappada 2000 – Monte Ferro SubArea Monte ferro
Comuni interessati	Sappada (BL)
Regione fitoclimatica	Mesalpica
Caratterizzazione altimetrica	Altimontana- Subalpina (1.233 – 1.852 m s.l.m.)
Caratterizzazione ambientale	
Ambiti di particolare valore naturalistico segnalati in prossimità dell'area di intervento	
Uso del suolo	
Elementi antropici di disturbo già presenti	
Dimensioni dell'intervento	



Tipologia intervento	Ammodernamento/ potenziamento
Interventi complementari previsti	
Incremento superficie teorica a parcheggio	
Esigenza di nuovo accesso stradale	
Frammentazione di habitat naturali	
Perdita di superficie naturale	
Introduzione di elementi innaturali	
Alterazione dell'assetto idro-geologico locale	
Valore strategico dell'intervento	
Localizzazione rispetto alla rete Natura 2000 (*)	A
Siti Natura 2000 coinvolti	IT3230089
Presenza di habitat prioritari di interesse comunitario	Si (>1)
Presenza di specie floristiche prioritarie di interesse comunitario	NO
Presenza di specie faunistiche prioritarie di interesse comunitario	SI
Habitat di interesse comunitario (<i>sensu</i> All. I dir. Habitat) potenzialmente coinvolti (in termini di perdita di superficie, frammentazione, degrado)	
Specie o categorie floristiche di interesse comunitario (<i>sensu</i> All. II dir. Habitat) potenzialmente coinvolte e particolarmente sensibili/vulnerabili rispetto agli interventi previsti	
Specie o categorie faunistiche di interesse comunitario (<i>sensu</i> All. II dir. Habitat) potenzialmente coinvolte e particolarmente sensibili/vulnerabili rispetto agli interventi previsti	
Alterazione delle relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e la funzionalità della rete Natura 2000 (es. interruzione di corridoi ecologici, frammentazione degli habitat...)	
Presenza di altri piani/progetti/interventi locali potenzialmente impattanti sulla rete Natura 2000	
Presenza di incidenza significativa	Si
Necessità di ulteriori indagini ambientali e naturalistiche	SI
Necessità di V.Inc.A. in fase di progettazione	SI

(*) A = superficie di intervento ricadente anche solo parzialmente in area SIC e/o ZPS

B = superficie di intervento non ricadente in area SIC e/o ZPS



Esaminato le prescrizioni date dal Piano degli Interventi del 2007 (Piano pre – adottato) per l'area sciabile di Monte Ferro, considerato la presenza nell'area in esame di siti Natura 2000 e in particolare di habitat comunitari, si ritiene possibile procedere con una valutazione semplice e pragmatica ma spesso ritenuta esaustiva (Glasson, 1999).

Valutando le informazioni acquisite per la soluzione alternativa uno (Piano degli Interventi del 2007), si conferma quanto affermato nella Valutazione di Incidenza Preliminare al Piano degli Interventi stesso per l'area sciabile di Monte Ferro, per cui si attesta che effetti significativi negativi sono possibili sui siti della rete Natura 2000.

FASE 1: SOLUZIONE ALTERNATIVA DUE

Il Piano Regionale Neve (Piano Contro dedotto del Novembre 2009), ovvero la soluzione alternativa in esame, si distingue dal Piano degli interventi (Piano pre – adottato del luglio 2007) per i seguenti aspetti:

- l'introduzione di Norme Tecniche
- l'introduzione di Norme di Intervento Ambientale
- l'individuazione di demani sciabili definiti aree “contenitore” entro le quali possono essere presenti delle infrastrutture sciistiche e si potranno sviluppare nuove infrastrutture per lo sport sulla neve rispettando gli incrementi di sviluppo imposti dal Piano Neve per ciascun demanio.

NORME TECNICHE

Art. 1 Finalità

Il Piano Regionale Neve, di seguito PRN, rappresenta il piano di settore del sistema impianti e piste delle aree sciabili del Veneto.

Il PRN è finalizzato a:

- individuare le aree sciabili di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363;
- Razionalizzare la realizzazione degli impianti e delle piste, nonché delle infrastrutture complementari ed accessorie;
- qualificare gli impianti in relazione alla funzione di pubblico servizio;
- ottimizzare il rapporto impianti-piste.

Art. 2 Elaborati di Piano

Il PRN è composto da:

- Relazione generale;
- Relazione sci alpino;
- Relazione sci nordico;
- Rapporto ambientale;
- Sintesi non tecnica del rapporto ambientale;
- Valutazione d'incidenza;
- Tavole di corografia generale;
- Tavole stato di fatto

Art. 3 Definizioni

Impianto a fune: impianto destinato al servizio pubblico autorizzato all'esercizio per il trasporto di persone e di cose.

Pista: la superficie di terreno appositamente predisposta e abitualmente riservata alla circolazione e all'uso pubblico per la pratica degli sport sulla neve.

Snow park: la superficie di terreno appositamente predisposta e abitualmente riservata alle evoluzioni di specifici utenti, soggetta ad accesso regolamentato, distinta dalle piste di cui al punto precedente.

Area sciabile attrezzata: superficie innevata anche artificialmente aperta al pubblico e comprendente piste, impianti di risalita e di innevamento abitualmente riservata alla pratica degli sport sulla neve, quali lo sci da discesa nelle sue varie articolazioni, lo sci di fondo, la tavola da neve denominata snowboard, la slitta e lo slittino e gli altri sport sulla neve in cui vi sia l'uso di particolari mezzi e strumenti o di uno specifico equipaggiamento.

Demanio sciabile: superficie che per le sue caratteristiche e condizioni, nel rispetto dei principi e criteri di pianificazione del presente piano, è destinabile all'uso di area sciabile attrezzata.

Sub demanio sciabile: singola porzione di demanio sciabile all'interno del quale sono stati indicati parametri di sviluppo omogeneo.

Art. 4 Effetti del PRN e rapporti con gli altri strumenti di pianificazione

Il PRN è approvato in coordinamento e ad integrazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), così come previsto dall'articolo 7 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21.

Il PRN è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) in conformità alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 relativa alla valutazione degli effetti dei piani e dei programmi sull'ambiente.

Il PRN ha una validità di 10 anni. Trascorsi tre anni dalla sua approvazione possono essere presentate motivate richieste di revisione. Qualora almeno 2 amministrazioni comunali abbiano presentato, previa deliberazione di consiglio, richiesta di revisione non configurante semplice variante parziale del piano, si può procedere anticipatamente ad una revisione dello stesso.

Gli strumenti di pianificazione territoriali ed urbanistica di livello inferiore devono adeguarsi entro dodici mesi da quando il PRN acquista efficacia.

L'inutile decorso del termine di cui al comma precedente comporta l'applicazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Art. 5 Contenuti prevalenti

La definizione grafica del tracciato della linea di concessione dell'impianto di risalita e dei margini delle piste va considerato vincolante nei limiti della leggibilità grafica delle tavole allegate al Piano.

Il dato ufficiale della superficie sciabile di ogni singola pista e del tracciato di ogni singolo impianto è rappresentato, sino alla predisposizione del registro digitale, dagli elaborati grafici allegati al relativo provvedimento di approvazione.

Nel caso di contrasto di previsioni tra elaborati grafici, prevalgono le previsioni contenute in quelli a scala maggiore.

Nel caso di contraddizione tra previsioni di norme ed elaborati grafici, prevale quanto contenuto nel testo normativo.

Art. 6 Razionalizzazione delle aree sciabili

La realizzazione di impianti di risalita deve perseguire la finalità di:

- ammodernare e sostituire linee funiviarie già esistenti o di realizzare nuove linee atte alla dismissione di un numero pari o superiore di impianti.
- creare collegamenti sciistici atti a limitare l'uso dei mezzi di trasporto su gomma;
- creare nuove realtà sciistiche;

Al fine di tutelare e valorizzare la risorsa suolo, gli impianti e le piste per i quali vengono rispettivamente a cessare la concessione e l'autorizzazione devono essere dismessi e ripristinato lo stato dei luoghi precedente alla loro realizzazione.

Art. 7 Parametri di riferimento progettuale per lo sci alpino

I parametri sono i seguenti:

- posto sciatore impianto (PS/I): indica la capacità reale istantanea di un impianto di risalita ed è calcolato sulla portata oraria dell'impianto, diviso per il coefficiente di ripetitività orario (cr), calcolato sommando il tempo di risalita, il tempo medio di percorrenza della pista alla velocità statisticamente stimata in m. 2/min.sec ed il tempo di circa 2/3 min. primi di sosta "tecnica" alla stazione di valle.

- posto sciatore pista (PS/P): è dato dalla superficie totale della pista in metri quadrati, divisa per 200 calcolandosi convenzionalmente in metri quadrati duecento la superficie mediamente necessaria allo sciatore in evoluzione.

- portata della pista (P): è data dalla superficie sciabile netta divisa per la densità utile calcolata in sciatori/ettaro uguale a 50.

– larghezza media della pista (LAM): oltre al dato geometrico intuibile ovvero la superficie della pista divisa per la lunghezza, il termine è utilizzato come indicazione della larghezza media necessaria per assicurare una portata compatibile con la densità utile. In termini concreti si assume congrua una LAM corrispondente alla portata dell'impianto diviso un numero fisso individuato in 30. questo valore è il risultato del seguente calcolo:

- coefficiente di arroccamento (C.Arr.): costituisce il dato stimato sulla costituzione elettiva del singolo impianto a portare in quota sciatori in semplice trasferimento verso altri impianti; C.Arr. 0,70 significa che il 70% degli sciatori utilizza l'impianto in termini di circuito ripetitivo, mentre il 30% si considera in transito verso altri impianti.

- capacità istantanea: per la pista è corrispondente alla portata della pista;

mentre per l'impianto è la portata oraria divisa per il cr. Infine la capacità integrata corrisponde al numero di persone che trovano collocazione contemporanea in un singolo ambito impianto-pista/e e

corrisponde al numero di sciatori in pista (con densità pari a 50 sciatori/ettaro) maggiorato dagli sciatori in linea di impianto o in attesa tecnica di imbarco (escluse le code che non dovrebbero esserci in un sistema correttamente dimensionato) - rapporto presenza/utenti: non ogni ospite delle stazioni invernali è un utente del sistema impianti/piste e non ogni utente lo è di norma a tempo pieno. Il dimensionamento delle strutture impiantistiche in rapporto alle infrastrutture ricettive (diurne e notturne) viene calcolato in 0,6 sciatoria per una presenza. Questo rapporto può variare fino a 0,8 nelle stazioni di afflusso prevalentemente festivo e diurno.

- capacità di arroccamento: per i sistemi sciistici raggiungibili solo con gli impianti a fune la capacità dei sistemi stessi è definita dal numero degli utenti che l'impianto di arroccamento riesce a portare in quota in un tempo compatibile con le esigenze dello sciatore. Il tempo utile di arroccamento viene convenzionalmente considerato di 2 ore e 30 minuti, sicché la capacità di arroccamento equivale alla portata oraria per 2,5. Il rapporto PSI/PSP dei sistemi a monte non dovrà superare nel loro complesso la capacità di arroccamento.

- accesso regolamentato: per le strutture che necessitano di un accesso regolamentato o limitato ad alcune categorie di utenti il controllo potrà avvenire mediante una o più delle seguenti modalità: uso di sistemi tecnologici per la rilevazione del passaggio delle persone; presenza di un operatore in loco; varchi di passaggio obbligato ove siano ben visibili e comprensibili le condizioni che regolano l'accesso e l'uso della struttura.

Analisi sviluppate sulla base dei rilievi statistici di cui all'art. 2 della l.r. n. 21/2008 possono condurre alla variazione dei parametri di cui ai punti precedenti, da approvarsi mediante provvedimento di Giunta Regionale.

Art. 8 Parametri di riferimento progettuale per lo sci nordico

I valori indicati nella "relazione sci nordico" ed i parametri sotto riportati sono di riferimento per l'analisi dei progetti di nuove opere.

I parametri sono i seguenti:

- portata della pista: uno sciatore di fondo abbisogna mediamente di una dimensione spaziale libera pari a 20 metri di distanza dal fondista che lo precede e da quello che lo segue, talché la portata di una pista può essere fissata in 50 sciatori/Km lineare di binario. Assunto come standard la conformazione di pista a doppio binario per senso di marcia si determina quindi la portata massima della pista in 100 sciatori/Km per senso di marcia.

- coefficiente di contemporaneità: nel corso della giornata si verifica un ricambio medio di sciatori contemporaneamente in pista pari a due cicli; ciò significa che ad una presenza istantanea di 100 sciatori su un chilometro di pista equivale una presenza in loco, non contemporanea, ma distribuita nell'arco della giornata, pari a 200 sciatori (coeff. di contemporaneità = 0,5).

- calcolo strutture di supporto: le strutture di supporto (ristoro, spogliatoio, sciolinatura, servizi igienici) vengono calcolate in 0,2 mq./sciatore; tale parametro medio può essere aumentato o diminuito quando, rispettivamente, il centro si trovi completamente isolato o quando esistano altre strutture ricettive (anche non specifiche) in zona.

- richiesta attrezzatura: a seconda delle località (con maggior richiesta nei centri più vicini alla pianura) la richiesta di attrezzature da noleggio si fissa su una quota pari all'1% della massima ricettività dello stesso.

Analisi sviluppate sulla base dei rilievi statistici di cui all'art. 2 della l.r. n. 21/2008 possono condurre alla variazione dei parametri di cui al punto precedente, da approvarsi mediante provvedimento di Giunta Regionale.

Art. 9 Aree di sosta

Presso i punti di accesso alle aree sciabili devono essere previsti idonei spazi di sosta per i veicoli utilizzati per raggiungere le aree stesse.

A tale riguardo dovrà essere posta particolare attenzione alle differenti tipologie di veicoli da accogliere nelle aree di sosta riservando, compatibilmente alle condizioni del luogo, spazi adeguati per le autovetture e per gli autobus. Inoltre si dovranno considerare i cosiddetti "veicoli ricreazionali" per i quali si può prevedere il servizio di "sosta attrezzata" con servizi mirati.

Ogni sciatore che accede al centro del fondo con mezzi propri meccanizzati richiede mediamente 6 mq. di parcheggio, fissando una media di occupazione dei veicoli di tre persone.

Art. 10 Monitoraggio

Le informazioni raccolte mediante il monitoraggio devono essere tenute in considerazione nel caso di eventuali modifiche al piano e sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione e di programmazione.

Il monitoraggio ambientale previsto dalla disciplina in tema di valutazione ambientale strategica rappresenta parte integrante del sistema di monitoraggio del PRN.

La giunta regionale individua gli indicatori idonei a controllare gli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del PRN, anche al fine di adottare le opportune misure di mitigazione degli stessi.

La Giunta regionale, avvalendosi dei soggetti istituzionali preposti alla gestione di dati e informazioni di natura ambientale, territoriale e socio-economica, determina modi e tempi con cui attuare il monitoraggio del PRN.

Art. 11 norma finale

Il PRN entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul BUR.

NORME DI INTERVENTO AMBIENTALE

CRITERI E DIVIETI	MODALITA' DI ESECUZIONE	INTERVENTI SPECIFICI	INTERVENTI ACCESSORI	ATTIVITA'	COMPORTAMENTI
A	B	C	D	E	F
Tutela degli habitat prioritari e degli habitat di specie prioritarie	Accurata delimitazione e breve durata dei cantieri	Sistemazione idraulica dei versanti coinvolti con tecniche a basso impatto ambientale.	Censimento delle arene di canto del gallo forcello e del gallo cedrone e la loro tutela.	Segnalazione di pochi itinerari pedonali in modo da favorire la frequentazione, anche estiva, di zone limitate, lasciando le altre indisturbate.	Limitazione o divieto della pratica dello sci fuori pista.
Tutela di tutti i biotopi esistenti, con particolare riferimento alle zone umide.	Rinverdimento tempestivo delle superfici dissodate con tecniche di ingegneria naturalistica e preferendo l'utilizzo di sementi locali.	Creazione di barriere vegetali ai margini delle piste e in prossimità dei punti di ristoro.	Istituzione di zone di quiete, dove, attraverso opportuni sistemi di dissuasione (chiusura di strade e dei sentieri), venga disincentivata la frequentazione, anche nel corso dei mesi primaverili ed estivi.	Adeguata segnalazione delle funi sospese	Limitazione al transito veicolare lungo la pista nel periodo estivo.
Tutela dei corridoi ecologici.	Arricchimento della composizione specifica della flora arbustivo/arborea nelle fasce di margine fra bosco di conifere e le piste.		In ambiti omogenei, privi di rifugi per piccoli animali, realizzazione di modesti cumuli di pietre (ciò può fornire habitat per micromammiferi, rettili, anfibi).	Rimozione degli elementi fuori terra del sistema di innevamento programmato	Opportuna comunicazione ai turisti, attraverso strumenti diversi (pannelli, pieghevoli, ecc.), delle presenze faunistiche della zona e del loro

					livello di vulnerabilità nel corso dell'inverno e della stagione riproduttiva primaverile e estiva.
Realizzazione degli interventi al di fuori del periodo riproduttivo delle specie più sensibili.	Nel caso di piste e impianti in ambienti boscati, favorire margini frastagliati, piuttosto che linee diritte, in modo da aumentare le fasce di margine ("ecotoni"), luoghi privilegiati per la fauna.		In prossimità di bacini di raccolta d'acqua per l'innevamento artificiale, favorire la realizzazione di piccole pozze, magari in zone marginali più riparate, che possano fungere da serbatoio per anfibi (per la riproduzione e, soprattutto, lo svernamento).	Rimozione, nei periodi di non esercizio, delle reti di protezione	
Deroga parziale, sempre nel rispetto dei principi di sicurezza, ai requisiti minimi previsti dalle NTA per il rispetto di puntuali emergenze e/o ambiti naturalistici di particolare pregio	Impiego di mezzi silenziati e in buono stato di conservazione (per evitare la dispersione di olii o combustibili).				

FASE 2: SOLUZIONE ALTERNATIVA DUE

2.1) Aree interessate e caratteristiche dimensionali



Fig. 1: Individuazione dell'ambito sciabile A04 Monte Ferro rappresentato dal poligono di colore verde.



Nella tabella seguente si riportano le caratteristiche relativamente all'ambito demaniale A04. Monte Ferro.

DEMANIO	A04.
NOME AMBITO	Monte Ferro
Provincia	BL
Comuni	Sappada
TIPOLOGIA	B
Totale area piste esistenti (ha)	35,6
Incremento piste esistenti per interventi realizzati ai fini della sicurezza (ha)	5,3
Incremento piste esistenti per altri interventi (ha)	1,8
Percentuale di sviluppo concessa per la realizzazione di nuove aree sciabili (%)	2
Superficie disponibile per nuove aree sciabili (ha)	7,6
Superficie potenziale complessiva (ha)	50,3
Rapporto tra piste esistenti e potenziale complessiva	0,71
Area dell'ambito (ha)	380,0

Tab.: Caratteristiche ambito demaniale A04 Monte Ferro

Infrastrutture sciistiche esistenti

Nella tabella seguente si riporta il quadro complessivo delle infrastrutture esistenti nell'ambito sciistico A04 Monte Ferro

A04 Monte Ferro	
Tipologia: B	Demanio: A04
Totale area piste esistenti (mq): 355.612	
Impianti attivi: 7	di cui: Funivie: 0
	Seggiovie: 3
	Sciovie: 4

Tab.: Infrastrutture esistenti nell'ambito sciistico A04 Monte Ferro.



Interventi previsti dal Piano Neve

Nell'ambito-sciistico A04 Monte Ferro sono attualmente presenti 35,6 ha di piste da sci, e gli interventi previsti dal Piano Neve per questo ambito sono riassunti nella tabella seguente:

Totale area piste esistenti (ha)	35,6
Incremento piste esistenti per interventi realizzati ai fini della sicurezza (ha)	5,3
Incremento piste esistenti per altri interventi (ha)	1,8
Percentuale di sviluppo concessa per la realizzazione di nuove aree sciabili (%)	2
Superficie disponibile per nuove aree sciabili (ha)	7,6
Superficie potenziale complessiva (ha)	50,3

Tab.: Infrastrutture previste per l'ambito sciistico A04 Monte Ferro.

Il rapporto percentuale tra le piste esistenti e la superficie potenziale complessiva (la superficie potenziale complessiva è data dalla somma dei valori di superficie piste esistenti, incremento piste esistenti per interventi realizzati ai fini della sicurezza, incremento piste esistenti per altri interventi, superficie disponibile per nuove aree sciabili) è del 71%, per cui secondo la seguente tabella di classificazione si definisce il seguente ambito come **ambito sciistico di integrazione**. Ciò significa che l'incremento potenziale di nuove aree sciabili nell'ambito sciistico è del 29 % della superficie potenziale complessiva ed è pari a 14,71 ha.

Classificazione sciistico	ambito	Rapporto tra le piste esistenti e superficie potenziale complessiva	Ambito sciistico A04 Monte Ferro
Ambito nuovo		0 – 25 %	
Ambito di completamento		26 – 50 %	
Ambito di integrazione		51 – 75 %	71%
Ambito confermato		76 – 100 %	



2.2) Durata dell'attuazione e cronoprogramma

Il PRN ha una validità di 10 anni. Trascorsi tre anni dalla sua approvazione possono essere presentate motivate richieste di revisione. Qualora almeno 2 amministrazioni comunali abbiano presentato, previa deliberazione di consiglio, richiesta di revisione non configurante semplice variante parziale del piano, si può procedere anticipatamente ad una revisione dello stesso.

Gli strumenti di pianificazione territoriali ed urbanistica di livello inferiore devono adeguarsi entro dodici mesi da quando il PRN acquista efficacia. L'inutile decorso del termine di cui al comma precedente comporta l'applicazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Il Piano Neve è lo strumento di pianificazione del sistema impiantistico funiviario e sciistico regionale, come a suo tempo previsto dall'art. 2 della L.R. n. 18 del 6 marzo 1990 e nel rispetto delle direttive, delle prescrizioni e dei vincoli del PTRC e nel quadro degli indirizzi e delle scelte del piano regionale dei trasporti, così come recita ora l'art. 7 della legge regionale n. 21 del 21 novembre 2008, stabilisce:

- una razionale realizzazione di impianti e piste;
- la qualifica degli impianti in relazione alla funzione di pubblico servizio;
- l'ottimizzazione del rapporto impianti-piste.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2988 del 01/10/2004 il Piano Neve è stato inserito nell'elenco dei piani e programmi da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, così come introdotta dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27/06/2001.

La Direzione Mobilità, in accordo con quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 3262 del 24/10/2004 ha prodotto apposito documento programmatico preliminare, con allegata relazione ambientale nonché l'elenco delle autorità aventi competenza in materia ambientale e dei soggetti interessati all'approvazione del Piano Neve per l'acquisizione del parere della Commissione regionale VAS finalizzato a verificare preliminarmente la compatibilità degli obiettivi del Piano con la sostenibilità ambientale. Nella seduta del 31/05/2007 la Commissione regionale per la VAS ha espresso parere

favorevole ai succitati elaborati subordinatamente all'osservanza di una serie di prescrizioni per la stesura del Rapporto Ambientale. Con D.G.R.V. n. 1649 del 05/06/2007 sono state adottate le Linee guida per la redazione del Piano Neve recependo i contenuti del documento programmatico preliminare, della Relazione ambientale, l'elenco delle autorità aventi



competenza ambientale e dei soggetti interessati all'adozione del Piano e le prescrizioni imposte dalla Commissione regionale VAS. Con D.G.R.V. n. 2107 del 21/07/07 è stato adottato preliminarmente il Piano degli Interventi per la razionalizzazione del settore impiantistico funiviario e delle aree sciabili, composto da una parte generale, dall'analisi dello stato di fatto, dalla valutazione di incidenza sul Piano e da una raccolta di tutte le ipotesi di intervento espresse dalle varie Amministrazioni Locali. A febbraio 2008 è stata presentata e condivisa con tutti i soggetti interessati la proposta di piano. Da quanto emerso in seguito a questi incontri è stato sviluppato il piano regionale neve con l'allegato rapporto ambientale.

2.3) Individuazione dei siti della rete Natura 2000 e dagli elementi chiave di questi

Elenco siti della rete Natura 2000 coinvolti dall'ambito sciistico A04 Monte Ferro:

- **SIC IT3230006**
Nome Sito: Val Visdende – Monte Peralba – Quaternà

- **SIC IT3230085**
Nome Sito: Comelico – Bosco della Digola – Brentoni - Tudaio

- **ZPS IT3230089**
Nome Sito: Dolomiti del Cadore e Comelico




Fig. 2: Individuazione dell'ambito sciabile A04 Monte Ferro rappresentato dal poligono di colore verde. Le aree evidenziate dalle campiture colorate rappresentano i siti Natura 2000 e rispettivamente: giallo per il SIC IT3230006, rosso per il ZPS IT3230089, azzurro per il SIC IT3230085. La linea di colore magenta rappresenta la viabilità principale, mentre con la linea blu si individua la rete idrografica.

2.4) Indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione

Sono state considerate le interrelazioni del piano in oggetto con gli altri strumenti pianificatori (piani o programmi) che interessano l'area, quindi le dipendenze derivanti da altri sistemi decisionali e viceversa le influenze su altri contesti di pianificazione, così da delineare un quadro completo di obiettivi e decisioni interessanti l'area di piano.

- PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO
- PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI BELLUNO
- PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI SAPPADA. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



2.5) Individuazione dei possibili effetti del Piano

Il procedimento adottato per l'individuazione dei possibili effetti del piano è stato riconosciuto e collaudato in occasione di altre valutazioni di incidenza ambientale, come ad esempio quella per il P.T.C.P. della Provincia di Belluno

Nella tabella che segue vengono valutati gli articoli delle Norme Tecniche e delle Norme di Intervento Ambientale, attraverso i seguenti parametri, cui va attribuito un significato esclusivamente probabilistico non essendo espressione di una misura, o di una valutazione oggettiva:

T = Possibili effetti sulla naturalità dell'ambiente e degli ecosistemi

Indica l'apporto diretto o indiretto, ma comunque tangibile delle norme rispetto all'attuale stato dell'ambiente e degli ecosistemi, con i seguenti valori:

- 1 può incrementare la naturalità
- 2 conserva l'attuale livello di naturalità
- 3 influisce negativamente sugli assetti naturali
- 4 non produce alcun effetto

Se la norma non produce affetti sull'ambiente e sugli ecosistemi non possono essere espresse valutazioni né in merito alle modalità con cui vengono indotti gli effetti (campo A), né sul fatto che gli effetti si possano scaricare su componenti di Rete Natura 2000 (campo D). In tal caso, dunque, nella tabella che segue restano vuoti i campi destinati ad A e a D.

In alcuni casi è difficile valutare il possibile effetto in quanto questo dipenderà dalla localizzazione delle rispettive previsioni. A seconda della progettazione di massima ed esecutiva l'effetto potrà essere nullo o negativo.

A = Modalità di attuazione della norma

Questo esprime le modalità con cui si può sviluppare l'azione di piano regolata dalla norma:



- 1 con azione diretta (l'azione e i relativi impatti sono ascrivibili al dominio del PIANO REGIONALE NEVE)
- 2 con azione indiretta (l'azione e i relativi impatti sono valutabili in sede di progettazione dei singoli interventi, ovvero impianti e piste da sci e quant'altro sia legato alla pratica dello sport sulla neve)

Se la norma rimanda alla progettazione dei singoli interventi lo sviluppo di specifiche azioni, non è possibile, a questo livello, prevederne gli effetti. Per tale motivo nel caso che l'indice A valga 2, nella tabella che segue il campo D resta vuoto.

D = Disturbo sui Siti Natura 2000

Questo indicatore giova a qualificare l'azione del piano in merito ai possibili disturbi portati ai siti di Natura 2000:

- 1 Possibile/potenziale disturbo direttamente connesso con il sito o in area di prossimità al sito
- 2 Possibile/potenziale disturbo indiretto (emissioni, pressione antropica, etc.)
- 3 Disturbo nullo

ARTICOLI DELLE NORME TECNICHE E NORME DI INTERVENTO AMBIENTALE	T	A	D
Art. 1 Finalità	4		
Art. 2 Elaborati di Piano	4		
Art. 3 Definizioni	4		
Art. 4 Effetti del PRN e rapporti con gli altri strumenti di pianificazione	4		
Art. 5 Contenuti prevalenti	4		
Art. 6 Razionalizzazione delle aree sciabili	3,4	1,2	1,2
Art. 7 Parametri di riferimento progettuale per lo sci alpino	3,4	2	
Art. 7 Parametri di riferimento progettuale per lo sci nordico	3,4	2	
Art. 9 Aree di sosta	3,4	2	
Art. 10 Monitoraggio	1,2	1	3



Art. 11 Norma finale	4		
A Criteri e divieti	2	1,2	3
B Modalità di esecuzione	2	1,2	3
C Interventi specifici	2	1,2	3
D Interventi accessori	2	1,2	3
E Attività	2	1,2	3
F Comportamenti	2	1,2	3



2.6) Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire congiuntamente

Dall'analisi di eventuali effetti cumulativi che si dovessero sommare a quelli indotti dal piano in esame si è riscontrato che il PRN per l'ambito sciistico A04 Monte Ferro può interagire congiuntamente con i seguenti piani:

- PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI BELLUNO
- PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI SAPPADA. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

FASE 3: SOLUZIONE ALTERNATIVA DUE

3.1) Definizione dei limiti spaziali e temporali dell'analisi

Il PIANO REGIONALE NEVE (PRN) è uno strumento di pianificazione in cui si delineano strategie di trasformazione del territorio al fine di pianificare l'attività sciistica in Veneto, attraverso interventi articolati di cui non si possiedono ancora precise indicazioni né in merito al momento d'attuazione, né al luogo preciso in cui si interverrà, né alle tecniche costruttive e dimensionali delle possibili trasformazioni del territorio. Qualità queste che saranno presenti in sede di progettazione dei singoli interventi (impianti di risalita, piste da sci, etc.), per i quali le relative Valutazioni di Incidenza potranno essere sempre più mirate.

La valutazione del livello di pericolosità, cioè della probabilità che l'intervento porti disturbo, e quella inerente la sensibilità (vulnerabilità) delle specie e delle comunità (habitat), richiedono conoscenze di maggior dettaglio che dovranno essere acquisite, con crescente precisione.

Integrando le informazioni delle azioni del piano con le informazioni conglobate nel valore attribuito ad ogni Sito Natura 2000 e portato da ogni sua componente (habitat e specie), si può dare una dimensione dei possibili generatori di disturbo, o fattori di incidenza, ovvero dell'attenzione con cui si devono valutare gli interventi o le strategie del piano.

La fase precedente ha evidenziato che soltanto una delle norme del PRN (art. 6 Razionalizzazione delle aree sciabili) è in grado di determinare potenziali azioni in grado di produrre incidenze. È necessario a questo punto una seconda fase diretta a valutare entro a quale ambito possono esplicitarsi le azioni indotte da tale norma e di conseguenza se la stessa norma può indurre impatti o incidenze sugli ambienti tutelati dalla Rete Natura 2000, utilizzare risorse e determinare direttamente e/o indirettamente effetti di emissione, di produzione di rumori e di rifiuti.

La dimensione spaziale dell'analisi delle possibili incidenze del piano coincide con l'ambito-demanio sciabile. I demani sciabili sono delle aree "contenitore" nelle quali le attività sciistiche e le opere ed attrezzature accessorie vengono realizzate nel pieno rispetto della sicurezza ambientale, idrogeologica e del rispetto naturalistico e paesaggistico. Essi non sono quindi delle porzioni di territorio che saranno interamente occupati da impianti e/o piste da sci ma dei contenitori dove effettuare, nel rispetto delle norme tecniche e dei principi di

protezione ambientale e di compatibilità (art. 9 L.R. 21/2008), le attività regolate dalla l.r. 21/2008.

Nella fattispecie il limite spaziale dell'analisi coincide con i limiti del demanio sciabile A04 Monte Ferro.

I limiti temporali dell'analisi degli effetti del piano e dei programmi sull'ambiente coincidono con i limiti di validità del PRN, ovvero 10 anni.



Fig. 3: Individuazione dell'ambito sciabile A04 Monte Ferro rappresentato dal poligono di colore verde. La linea tratteggiata di colore nero individua il confine amministrativo del comune di Sappada e altri.

3.2) Identificazione dei siti della rete Natura 2000 interessati e descrizione

3.2.1) Elenco siti della rete Natura 2000 coinvolti dall'ambito sciistico (area di valutazione)

- **ZPS IT3230089**

Nome Sito: **Dolomiti del Cadore e Comelico**




Fig. 4: Individuazione dell'ambito sciabile A04 Monte Ferro rappresentato dal poligono di colore verde. L'area evidenziata dalla campitura di colore rosso rappresenta il sito Natura 2000 coinvolto, ovvero il ZPS IT3230089. La linea tratteggiata di colore nero individua il confine amministrativo del comune di Sappada e altri.

3.2.2) Elenco degli habitat comunitari coinvolti dall'ambito sciistico (area di valutazione)




Fig. 5: Habitat comunitari coinvolti dall'ambito sciistico A04 Monte Ferro. Nell'immagine, in alto a destra, si riporta la legenda dei colori con i quali si evidenziano gli habitat comunitari coinvolti, mentre la linea di colore rosso rappresenta il perimetro dell'ambito sciistico A04 Monte Ferro, la linea di colore magenta rappresenta la viabilità principale, la linea di colore blu individua la rete idrografica e la linea tratteggiata di colore nero individua il confine amministrativo del comune di Sappada e altri.

**Habitat comunitari coinvolti**

Nella seguente tabella si riporta l'elenco degli habitat comunitari presenti nei siti della Rete Natura 2000 coinvolti dall'ambito sciistico A04 Monte Ferro. Nella stessa tabella sono stati evidenziati gli habitat comunitari coinvolti dall'ambito sciistico A04 Monte Ferro.

SITO NATURA 2000	CODICE HABITAT	NOME HABITAT	PRESENZA HABITAT NELL'AREA DI VALUTAZIONE
IT3230089	3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea	NO
IT3230089	3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.	NO
IT3230089	3160	Laghi e stagni distrofici naturali	NO
IT3230089	3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea	NO
IT3230089	3230	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica	NO
IT3230089	3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos	Sì
IT3230089	4060	Lande alpine e boreali	Sì
IT3230089	4070*	Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)	Sì
IT3230089	4080	Boscaglie subartiche di Salix spp.	NO
IT3230089	6150	Formazioni erbose boreo-alpine silicee	Sì
IT3230089	6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine	Sì
IT3230089	6210*	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (notevole fio	NO
IT3230089	6230*	Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa	NO
IT3230089	6410	Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)	NO
IT3230089	6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile	NO



IT3230089	6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	NO
IT3230089	6520	Praterie montane da fieno	Sì
IT3230089	7110*	Torbiere alte attive	NO
IT3230089	7140	Torbiere di transizione e instabili	NO
IT3230089	7150	Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion	NO
IT3230089	7220*	Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (<i>Cratoneurion</i>)	NO
IT3230089	7230	Torbiere basse alcaline	Sì
IT3230089	7240*	Formazioni pioniere alpine del <i>Caricion</i> <i>bicoloris-atrofuscae</i>	NO
IT3230089	8110	Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (<i>Androsacetalia alpinae</i> e <i>Galeopsietalia ladani</i>)	Sì
IT3230089	8120	Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)	Sì
IT3230089	8160*	Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna	NO
IT3230089	8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmoftica	Sì
IT3230089	8220	Pareti rocciose silicee con vegetazione casmoftica	NO
IT3230089	8240*	Pavimenti calcarei	NO
IT3230089	8340	Ghiacciai permanenti	NO
IT3230089	9110	Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i>	NO
IT3230089	9130	Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagetum</i>	NO
IT3230089	9140	Faggeti subalpini dell'Europa centrale con <i>Acer</i> e <i>Rumex arifolius</i>	NO
IT3230089	9150	Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del <i>Cephalanthero-Fagion</i>	NO
IT3230089	9180*	Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>	NO
IT3230089	91D0*	Torbiere boschive	NO
IT3230089	91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion</i> <i>incanae</i>, <i>Salicion albae</i>)	Sì
IT3230089	91H0*	Boschi pannonicici di <i>Quercus pubescens</i>	NO
IT3230089	91K0	Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)	Sì
IT3230089	9410	Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i>	Sì



		(Vaccinio-Piceetea)	
IT3230089	9420	Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra	Sì
IT3230089	9530*	Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici	NO

Nella seguente tabella si riporta l'elenco degli habitat comunitari coinvolti dall'ambito sciistico A04 Monte Ferro, nonché la superficie di occupazione di ciascun habitat.

Codice Habitat	Nome Habitat	Area Habitat coinvolto dall'ambito A04 Monte Ferro (ha)
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>	1,17
4060	Lande alpine e boreali	12,15
4070*	Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> (Mugo-Rhododendretum hirsuti)	15,93
6150	Formazioni erbose boreo-alpine silicee	1,96
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine	21,07
6520	Praterie montane da fieno	57,89
7230	Torbiere basse alcaline	1,50
8110	Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (<i>Androsacetalia alpinae</i> e <i>Galeopsietalia ladani</i>)	0,32
8120	Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>)	0,71
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	4,31
91E0*	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	0,10
91K0	Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>)	2,60
9410	Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i>	116,58



	(Vaccinio-Piceetea)	
9420	Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra	59,27

3.2.3) Tipologie di copertura del suolo

Sono state individuate le tipologie di copertura del suolo per il territorio compreso entro i limiti dell'area di analisi.

Nella seguente tabella si riportano le tipologie di copertura del suolo presenti entro l'ambito sciistico A04 Monte Ferro.

Codice	Denominazione	Area (ha)
1.1.2	Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)	2,37
1.2.2	Reti stradali e suoli associati	0,27
1.4.1	Aree verdi urbane	0,40
2.3.1	Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione	43,00
3.1.1	Bosco di latifoglie (Alneta di ontano verde – Faggeta altimontana)	6,65
3.1.2	Abieteto dei substrati carbonatici, dei substrati silicatici, dei suoli mesici tipico. Lariceto primitivo, tipico. Pecceta altimontana dei substrati carbonatici, Pecceta dei substrati silicatici dei suoli mesici altimontana, subalpina. Pecceta secondaria montana.	198,66
3.2.1	Pascoli di pertinenza di malga. Pascoli diversi.	97,67
3.2.2	Mugheta microterma	23,28
3.3.2	Piste da sci e linee di impianti di risalita. Ghiaioni	7,68
TOTALE		379,98




Fig. 6: Tipologie di copertura del suolo presenti nell'ambito sciistico A04 Monte Ferro. Nell'immagine, in alto a destra, si riporta la legenda dei colori con i quali si evidenziano le tipologie di copertura del suolo, mentre la linea di colore rosso rappresenta il perimetro dell'ambito sciistico A04 Monte Ferro, la linea di colore magenta rappresenta la viabilità principale, la linea di colore blu individua la rete idrografica e la linea tratteggiata di colore nero individua il confine amministrativo del comune di Sappada.



3.2.4) Elenco delle specie floristiche e faunistiche coinvolte dall'ambito sciistico (area di valutazione)

Flora e vegetazione

Elenco delle specie vegetali presenti nell'ambito sciistico A04 Monte Ferro

Per l'individuazione delle specie vegetali coinvolte nell'ambito sciistico A04 Monte Ferro sono stati consultati i formulari dei siti Natura 2000 coinvolti e il sito web www.vnr.unipg.it.

<i>Abies alba</i>	<i>Dryopteris expansa</i>	<i>Petasites hybridus</i>
<i>Acer campestre</i>	<i>Dryopteris filix-mas</i>	<i>Petasites paradoxus</i>
<i>Acer pseudoplatanus</i>	<i>Dryopteris remota</i>	<i>Peucedanum palustre</i>
<i>Achillea atrata</i>	<i>Dryopteris villarii</i>	<i>Phalaris arundinacea</i>
<i>Achillea clavenae</i>	<i>Eleocharis quinqueflora</i>	<i>Philadelphus coronarius</i>
<i>Achillea millefolium</i>	<i>Eleocharis uniglumis</i>	<i>Physoplexis comosa</i>
<i>Achillea moschata</i>	<i>Elyna myosuroides</i>	<i>Phyteuma orbiculare</i>
<i>Achillea oxyloba</i>	<i>Empetrum hermaphroditum</i>	<i>Phyteuma ovatum</i>
<i>Adenostyles alliariae</i>	<i>Epilobium collinum</i>	<i>Phyteuma sieberi</i>
<i>Adenostyles glabra</i>	<i>Epilobium parviflorum</i>	<i>Picea abies</i>
<i>Aegopodium podagraria</i>	<i>Epimedium alpinum</i>	<i>Pimpinella major</i>
<i>Agrostis agrostiflora</i>	<i>Epipactis atrorubens</i>	<i>Pinguicula vulgaris</i>
<i>Agrostis alpina</i>	<i>Epipactis helleborine</i>	<i>Pinus cembra</i>
<i>Agrostis capillaris</i>	<i>Epipactis palustris</i>	<i>Pinus mugo</i>
<i>Agrostis rupestris</i>	<i>Equisetum arvense</i>	<i>Pinus sylvestris</i>
<i>Agrostis stolonifera</i>	<i>Equisetum fluviatile</i>	<i>Plantago serpentina</i>
<i>Alchemilla flabellata</i>	<i>Equisetum hyemale</i>	<i>Poa cenisia</i>
<i>Allium schoenoprasum</i>	<i>Equisetum palustre</i>	<i>Poa laxa</i>
<i>Allium strictum</i>	<i>Equisetum pratense</i>	<i>Poa minor</i>
<i>Allium victorialis</i>	<i>Equisetum telmateja</i>	<i>Poa nemoralis</i>
<i>Alnus alnobetula</i>	<i>Equisetum variegatum</i>	<i>Poa pratensis</i>
<i>Alnus glutinosa</i>	<i>Erica carnea</i>	<i>Poa remota</i>
<i>Alnus incana</i>	<i>Erigeron atticus</i>	<i>Poa trivialis</i>
<i>Alnus viridis</i>	<i>Erigeron neglectus</i>	<i>Poa variegata</i>
<i>Alyssum ovirense</i>	<i>Erinus alpinus</i>	<i>Polygala alpestris</i>
<i>Amelanchier ovalis</i>	<i>Eriophorum latifolium</i>	<i>Polygala chamaebuxus</i>
<i>Amorpha fruticosa</i>	<i>Eritrichium nanum</i>	<i>Polygonatum verticillatum</i>
<i>Androsace alpina</i>	<i>Eritrichium nanum</i>	<i>Polygonum bistorta</i>
<i>Androsace hausmannii</i>	<i>Euphorbia amygdaloides</i>	<i>Polypodium vulgare</i>
<i>Androsace helvetica</i>	<i>Euphorbia carniolica</i>	<i>Populus nigra</i>
<i>Androsace lactea</i>	<i>Euphorbia verrucosa</i>	<i>Populus tremula</i>
<i>Androsace obtusifolia</i>	<i>Euphrasia minima</i>	<i>Potentilla aurea</i>
<i>Androsace wulfeniana</i>	<i>Euphrasia officinalis</i>	<i>Potentilla caulescens</i>



<i>Anemone baldensis</i>	<i>Euphrasia portae</i>	<i>Potentilla crantzii</i>
<i>Anemone narcissiflora</i>	<i>Fagus sylvatica</i>	<i>Potentilla erecta</i>
<i>Anemone nemorosa</i>	<i>Festuca alpina</i>	<i>Potentilla frigida</i>
<i>Anemone trifolia</i>	<i>Festuca gigantea</i>	<i>Potentilla nitida</i>
<i>Angelica sylvestris</i>	<i>Festuca halleri</i>	<i>Potentilla nivea</i>
<i>Antennaria carpatica</i>	<i>Festuca intercedens</i>	<i>Prenanthes purpurea</i>
<i>Anthoxanthum alpinum</i>	<i>Festuca nigrescens</i>	<i>Primula auricula</i>
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	<i>Festuca nigricans</i>	<i>Primula daonensis</i>
<i>Anthyllis alpestris</i>	<i>Festuca norica</i>	<i>Primula elatior</i>
<i>Anthyllis montana</i>	<i>Festuca paniculata</i>	<i>Primula farinosa</i>
<i>Aposeris foetida</i>	<i>Festuca picturata</i>	<i>Primula glaucescens</i>
<i>Aquilegia einseleana</i>	<i>Festuca pratensis</i>	<i>Primula minima</i>
<i>Aquilegia thalictrifolia</i>	<i>Festuca pulchella</i>	<i>Primula recubariensis</i>
<i>Arabis alpina</i>	<i>Festuca pumila</i>	<i>Primula spectabilis</i>
<i>Arabis bellidifolia</i>	<i>Festuca stenantha</i>	<i>Primula tyrolensis</i>
<i>Arabis collina</i>	<i>Festuca trichophylla</i>	<i>Primula veris</i>
<i>Arabis vochinensis</i>	<i>Festuca varia</i>	<i>Primula vulgaris</i>
<i>Arctostaphylos alpinus</i>	<i>Festuca vivipara</i>	<i>Pritzelago alpina</i>
<i>Arctostaphylos uva-urs</i>	<i>Filipendula ulmaria</i>	<i>Prunella vulgaris</i>
<i>Aremonia agrimonioides</i>	<i>Frangula alnus</i>	<i>Prunus padus</i>
<i>Arenaria ciliata</i>	<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Pteridium aquilinum</i>
<i>Armeria alpina</i>	<i>Fraxinus ornus</i>	<i>Pulsatilla alpina</i>
<i>Artemisia atrata</i>	<i>Fritillaria tubiformis</i>	<i>Pulsatilla alpina</i>
<i>Artemisia genipi</i>	<i>Galeopsis ladanum</i>	<i>Pulsatilla vernalis</i>
<i>Artemisia mutellina</i>	<i>Galium megalospermum</i>	<i>Quercus pubescens</i>
<i>Artemisia nitida</i>	<i>Galium mollugo</i>	<i>Ranunculus alpestris</i>
<i>Asplenium ceterach</i>	<i>Galium saxatile</i>	<i>Ranunculus bilobus</i>
<i>Asplenium lepidum</i>	<i>Galium uliginosum</i>	<i>Ranunculus cassubicus</i>
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	<i>Genista radiata</i>	<i>Ranunculus ficaria</i>
<i>Asplenium seelosii</i>	<i>Gentiana bavarica</i>	<i>Ranunculus glacialis</i>
<i>Asplenium trichomanes</i>	<i>Gentiana brachyphylla</i>	<i>Ranunculus hybridus</i>
<i>Asplenium viride</i>	<i>Gentiana clusii</i>	<i>Ranunculus montanus</i>
<i>Aster alpinus</i>	<i>Gentiana lutea</i>	<i>Ranunculus parnassifolius</i>
<i>Aster bellidiastrum</i>	<i>Gentiana nivalis</i>	<i>Ranunculus seguieri</i>
<i>Astragalus alpinus</i>	<i>Gentiana orbicularis</i>	<i>Ranunculus villarsii</i>
<i>Astragalus australis</i>	<i>Gentiana prostrata</i>	<i>Reynoutria japonica</i>
<i>Astragalus depressus</i>	<i>Gentiana pumila</i>	<i>Rhamnus pumilus</i>
<i>Astragalus frigidus</i>	<i>Gentiana terglouensis</i>	<i>Rhinanthus alectorolophus</i>
<i>Athamanta cretensis</i>	<i>Gentiana verna</i>	<i>Rhinanthus freynii</i>
<i>Athyrium distentifolium</i>	<i>Gentianella anisodonta</i>	<i>Rhizobotrya alpina</i>
<i>Athyrium filix-femina</i>	<i>Gentianella pilosa</i>	<i>Rhodiola rosea</i>
<i>Avenella flexuosa</i>	<i>Geranium argenteum</i>	<i>Rhododendron ferrugineum</i>
<i>Avenula versicolor</i>	<i>Geranium phaeum</i>	<i>Rhododendron hirsutum</i>
<i>Bartsia alpina</i>	<i>Geranium sylvaticum</i>	<i>Rhodothamnus chamaecistus</i>
<i>Berberis vulgaris</i>	<i>Geum montanum</i>	<i>Rosa arvensis</i>
<i>Bidens cernua</i>	<i>Geum reptans</i>	<i>Rosa pendulina</i>



<i>Biscutella laevigata</i>	<i>Geum rivale</i>	<i>Rubus caesius</i>
<i>Biscutella prealpina</i>	<i>Geum urbanum</i>	<i>Rubus idaeus</i>
<i>Blechnum spicant</i>	<i>Glechoma hederacea</i>	<i>Rumex scutatus</i>
<i>Blysmus compressus</i>	<i>Globularia cordifolia</i>	<i>Salix alba</i>
<i>Bolboschoenus maritimus</i>	<i>Gnaphalium supinum</i>	<i>Salix apennina</i>
<i>Botrychium virginianum</i>	<i>Goodyera repens</i>	<i>Salix appendiculata</i>
<i>Bromus ramosus</i>	<i>Gymnadenia odoratissima</i>	<i>Salix caprea</i>
<i>Buddleja davidii</i>	<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	<i>Salix cinerea</i>
<i>Bupthalmum salicifolium</i>	<i>Gymnocarpium robertianum</i>	<i>Salix daphnoides</i>
<i>Bupleurum petraeum</i>	<i>Gypsophila papillosa</i>	<i>Salix eleagnos</i>
<i>Calamagrostis arundinacea</i>	<i>Gypsophila repens</i>	<i>Salix glabra</i>
<i>Calamagrostis canescens</i>	<i>Hedera helix</i>	<i>Salix hastata</i>
<i>Calamagrostis epigejos</i>	<i>Hedysarum hedysaroides</i>	<i>Salix herbacea</i>
<i>Calamagrostis pseudophragmites</i>	<i>Helianthemum alpestre</i>	<i>Salix nigricans</i>
<i>Calamagrostis varia</i>	<i>Helianthemum grandiflorum</i>	<i>Salix pentandra</i>
<i>Calamagrostis villosa</i>	<i>Helleborus niger</i>	<i>Salix purpurea</i>
<i>Calamintha grandiflora</i>	<i>Heracleum sphondylium</i>	<i>Salix repens</i>
<i>Callianthemum coriandrifolium</i>	<i>Herminium monorchis</i>	<i>Salix reticulata</i>
<i>Callianthemum kerneranum</i>	<i>Herniaria alpina</i>	<i>Salix serpillifolia</i>
<i>Calluna vulgaris</i>	<i>Hieracium alpicola</i>	<i>Salix triandra</i>
<i>Caltha palustris</i>	<i>Hieracium alpinum</i>	<i>Salix waldsteiniana</i>
<i>Calystegia sepium</i>	<i>Hieracium amplexicaule</i>	<i>Sambucus nigra</i>
<i>Campanula caespitosa</i>	<i>Hieracium humile</i>	<i>Sanguisorba officinalis</i>
<i>Campanula carnica</i>	<i>Hieracium murorum</i>	<i>Saponaria pumila</i>
<i>Campanula cochleariifolia</i>	<i>Hieracium porrifolium</i>	<i>Saussurea alpina</i>
<i>Campanula latifolia</i>	<i>Hieracium villosum</i>	<i>Saxifraga adscendens</i>
<i>Campanula morettiana</i>	<i>Hippocrepis comosa</i>	<i>Saxifraga aizoides</i>
<i>Campanula petraea</i>	<i>Hippophaë rhamnoides</i>	<i>Saxifraga arachnoidea</i>
<i>Campanula raineri</i>	<i>Homogyne alpina</i>	<i>Saxifraga biflora</i>
<i>Campanula scheuchzeri</i>	<i>Homogyne discolor</i>	<i>Saxifraga bryoides</i>
<i>Cardamine alpina</i>	<i>Horminum pyrenaicum</i>	<i>Saxifraga burseriana</i>
<i>Cardamine resedifolia</i>	<i>Humulus lupulus</i>	<i>Saxifraga caesia</i>
<i>Cardamine rivularis</i>	<i>Huperzia selago</i>	<i>Saxifraga crustata</i>
<i>Cardamine trifolia</i>	<i>Hypericum coris</i>	<i>Saxifraga facchinii</i>
<i>Carduus carduelis</i>	<i>Hypochoeris facchiniana</i>	<i>Saxifraga hostii</i>
<i>Carduus personata</i>	<i>Hypochoeris uniflora</i>	<i>Saxifraga oppositifolia</i>
<i>Carex acuta</i>	<i>Impatiens glandulifera</i>	<i>Saxifraga paniculata</i>
<i>Carex acutiformis</i>	<i>Impatiens noli-tangere</i>	<i>Saxifraga petraea</i>
<i>Carex alba</i>	<i>Iris pseudacorus</i>	<i>Saxifraga sedoides</i>
<i>Carex atrata</i>	<i>Jovibarba arenaria</i>	<i>Saxifraga seguieri</i>
<i>Carex brachystachys</i>	<i>Juncus alpinoarticulatus</i>	<i>Saxifraga squarrosa</i>
<i>Carex brizoides</i>	<i>Juncus monanthos</i>	<i>Saxifraga tombeanensis</i>
<i>Carex brunnescens</i>	<i>Juncus subnodulosus</i>	<i>Scabiosa lucida</i>
<i>Carex capillaris</i>	<i>Juncus trifidus</i>	<i>Scabiosa vestina</i>
<i>Carex curvula</i>	<i>Juniperus communis</i>	<i>Schoenus ferrugineus</i>



<i>Carex davalliana</i>	<i>Juniperus nana</i>	<i>Schoenus nigricans</i>
<i>Carex digitata</i>	<i>Kerneria saxatilis</i>	<i>Scorzonera aristata</i>
<i>Carex dioica</i>	<i>Knautia baldensis</i>	<i>Scorzonera rosea</i>
<i>Carex elongata</i>	<i>Knautia drymeia</i>	<i>Scutellaria alpina</i>
<i>Carex ferruginea</i>	<i>Knautia longifolia</i>	<i>Scutellaria galericulata</i>
<i>Carex firma</i>	<i>Knautia velutina</i>	<i>Sedum alpestre</i>
<i>Carex flacca</i>	<i>Koeleria hirsuta</i>	<i>Sedum atratum</i>
<i>Carex flava</i>	<i>Laburnum anagyroides</i>	<i>Sedum dasyphyllum</i>
<i>Carex foetida</i>	<i>Lamium orvala</i>	<i>Sedum hispanicum</i>
<i>Carex frigida</i>	<i>Larix decidua</i>	<i>Selinum carvifolia</i>
<i>Carex fuliginosa</i>	<i>Laserpitium halleri</i>	<i>Senecio carniolicus</i>
<i>Carex hartmanii</i>	<i>Laserpitium peucedanoides</i>	<i>Senecio sylvaticus</i>
<i>Carex hostiana</i>	<i>Leontodon helveticus</i>	<i>Seseli libanotis</i>
<i>Carex humilis</i>	<i>Leontodon hispidus</i>	<i>Sesleria caerulea</i>
<i>Carex juncella</i>	<i>Leontodon montanus</i>	<i>Sesleria ovata</i>
<i>Carex lachenalii</i>	<i>Leontopodium alpinum</i>	<i>Sesleria sphaerocephala</i>
<i>Carex lepidocarpa</i>	<i>Leucanthemopsis alpina</i>	<i>Sibbaldia procumbens</i>
<i>Carex mucronata</i>	<i>Leucanthemum heterophyllum</i>	<i>Silene acaulis</i>
<i>Carex ornithopoda</i>	<i>Leucanthemum ircutianum</i>	<i>Silene alpestris</i>
<i>Carex panicea</i>	<i>Leucojum vernum</i>	<i>Silene dioica</i>
<i>Carex pendula</i>	<i>Ligusticum lucidum</i>	<i>Silene elisabethae</i>
<i>Carex pseudocyperus</i>	<i>Ligusticum mutellina</i>	<i>Silene pusilla</i>
<i>Carex pulcaris</i>	<i>Ligusticum mutellinoides</i>	<i>Silene rupestris</i>
<i>Carex remota</i>	<i>Lilium bulbiferum</i>	<i>Silene saxifraga</i>
<i>Carex rupestris</i>	<i>Lilium martagon</i>	<i>Silene veselskyi</i>
<i>Carex sempervirens</i>	<i>Linaria alpina</i>	<i>Silene vulgaris</i>
<i>Carex sylvatica</i>	<i>Linnaea borealis</i>	<i>Solanum dulcamara</i>
<i>Carex umbrosa</i>	<i>Liparis loeselii</i>	<i>Soldanella alpina</i>
<i>Carlina acaulis</i>	<i>Listera cordata</i>	<i>Soldanella pusilla</i>
<i>Carum carvi</i>	<i>Loiseleuria procumbens</i>	<i>Solidago gigantea</i>
<i>Centaurea nigrescens</i>	<i>Lomatogonium carinthiacum</i>	<i>Solidago virgaurea</i>
<i>Centaurea pseudophrygia</i>	<i>Lonicera caerulea</i>	<i>Sorbus aria</i>
<i>Cephalanthera damasonium</i>	<i>Lonicera nigra</i>	<i>Sorbus aucuparia</i>
<i>Cerastium carinthiacum</i>	<i>Lonicera xylosteum</i>	<i>Sorbus chamaemespilus</i>
<i>Cerastium cerastioides</i>	<i>Luzula alpinopilosa</i>	<i>Stachys sylvatica</i>
<i>Cerastium sylvaticum</i>	<i>Luzula luzulina</i>	<i>Stellaria longifolia</i>
<i>Cerastium uniflorum</i>	<i>Luzula luzuloides</i>	<i>Stellaria nemorum</i>
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	<i>Luzula nivea</i>	<i>Streptopus amplexifolius</i>
<i>Chaerophyllum villarsii</i>	<i>Luzula pilosa</i>	<i>Swertia perennis</i>
<i>Chamorchis alpina</i>	<i>Luzula sylvatica</i>	<i>Symphytum officinale</i>
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	<i>Lycopodium annotinum</i>	<i>Taraxacum alpinum</i>
<i>Cicerbita alpina</i>	<i>Lycopus europaeus</i>	<i>Taraxacum cucullatum</i>
<i>Circaea lutetiana</i>	<i>Lysimachia nemorum</i>	<i>Taraxacum officinale</i>
<i>Cirsium oleraceum</i>	<i>Lysimachia nummularia</i>	<i>Taraxacum pacheri</i>
<i>Cirsium palustre</i>	<i>Maianthemum bifolium</i>	<i>Taxus baccata</i>
<i>Clematis alpina</i>	<i>Malaxis monophyllos</i>	<i>Telekia speciosissima</i>



<i>Clematis vitalba</i>	<i>Matteuccia struthiopteris</i>	<i>Thalictrum alpinum</i>
<i>Comastoma tenellum</i>	<i>Melampyrum pratense</i>	<i>Thalictrum foetidum</i>
<i>Corallorhiza trifida</i>	<i>Melampyrum sylvaticum</i>	<i>Thalictrum simplex</i>
<i>Cornus sanguinea</i>	<i>Melica nutans</i>	<i>Thelypteris limbosperma</i>
<i>Corydalis solida</i>	<i>Melittis melissophyllum</i>	<i>Thelypteris palustris</i>
<i>Corylus avellana</i>	<i>Mercurialis perennis</i>	<i>Thlaspi minimum</i>
<i>Cotoneaster tomentosus</i>	<i>Minuartia austriaca</i>	<i>Thlaspi rotundifolium</i>
<i>Crataegus monogyna</i>	<i>Minuartia biflora</i>	<i>Tofieldia calyculata</i>
<i>Crepis alpestris</i>	<i>Minuartia cherlerioides</i>	<i>Traunsteinera globosa</i>
<i>Crepis aurea</i>	<i>Minuartia rupestris</i>	<i>Trichophorum alpinum</i>
<i>Crepis kernerii</i>	<i>Moehringia bavarica</i>	<i>Trichophorum caespitosum</i>
<i>Crepis mollis</i>	<i>Moehringia ciliata</i>	<i>Trientalis europaea</i>
<i>Crepis paludosa</i>	<i>Moehringia glaucovirens</i>	<i>Trifolium alpinum</i>
<i>Crepis pontana</i>	<i>Moehringia muscosa</i>	<i>Trifolium pratense</i>
<i>Crepis pygmaea</i>	<i>Molinia caerulea</i>	<i>Trifolium repens</i>
<i>Crepis pyrenaica</i>	<i>Moneses uniflora</i>	<i>Trifolium thalii</i>
<i>Crocus albiflorus</i>	<i>Moneses uniflora</i>	<i>Triglochin palustre</i>
<i>Cryptogramma crispa</i>	<i>Monotropa hypopitys</i>	<i>Trisetum distichophyllum</i>
<i>Cucubalus baccifer</i>	<i>Myosotis sylvatica</i>	<i>Trisetum flavescens</i>
<i>Cyclamen purpurascens</i>	<i>Myosoton aquaticum</i>	<i>Trisetum spicatum</i>
<i>Cypripedium calceolus</i>	<i>Nardus stricta</i>	<i>Trollius europaeus</i>
<i>Cystopteris fragilis</i>	<i>Neottia nidus-avis</i>	<i>Tulipa sylvestris</i>
<i>Cystopteris montana</i>	<i>Nigritella buschmanniae</i>	<i>Tussilago farfara</i>
<i>Cystopteris regia</i>	<i>Nigritella nigra</i>	<i>Ulmus glabra</i>
<i>Dactylis glomerata</i>	<i>Nigritella rubra</i>	<i>Urtica dioica</i>
<i>Dactylorhiza cruenta</i>	<i>Ophrys insectifera</i>	<i>Vaccinium gaultherioides</i>
<i>Dactylorhiza incarnata</i>	<i>Oplismenus undulatifolius</i>	<i>Vaccinium myrtillus</i>
<i>Dactylorhiza majalis</i>	<i>Orchis mascula</i>	<i>Vaccinium vitis-idaea</i>
<i>Dactylorhiza traunsteineri</i>	<i>Orchis spitzelii</i>	<i>Valeriana dioica</i>
<i>Daphne petraea</i>	<i>Oreochloa disticha</i>	<i>Valeriana elongata</i>
<i>Daphne reichsteinii</i>	<i>Orthilia secunda</i>	<i>Valeriana montana</i>
<i>Daphne striata</i>	<i>Ostrya carpinifolia</i>	<i>Valeriana salianca</i>
<i>Dentaria enneaphyllos</i>	<i>Oxalis acetosella</i>	<i>Valeriana saxatilis</i>
<i>Dentaria pentaphyllos</i>	<i>Oxyria digyna</i>	<i>Valeriana supina</i>
<i>Deschampsia caespitosa</i>	<i>Oxytropis campestris</i>	<i>Valeriana tripteris</i>
<i>Dianthus barbatus</i>	<i>Oxytropis lapponica</i>	<i>Veronica alpina</i>
<i>Dianthus glacialis</i>	<i>Oxytropis montana</i>	<i>Veronica aphylla</i>
<i>Dianthus superbus</i>	<i>Paederota bonarota</i>	<i>Veronica bellidioid</i>
<i>Diphasiastrum complanatum</i>	<i>Paederota lutea</i>	<i>Veronica urticifolia</i>
<i>Dipsacus pilosus</i>	<i>Papaver rhaeticum</i>	<i>Viburnum lantana</i>
<i>Doronicum clusii</i>	<i>Paradisea liliastrum</i>	<i>Viburnum opulus</i>
<i>Doronicum glaciale</i>	<i>Parnassia palustris</i>	<i>Vicia oroboides</i>
<i>Doronicum grandiflorum</i>	<i>Pedicularis comosa</i>	<i>Vicia sepium</i>
<i>Draba aizoides</i>	<i>Pedicularis elongata</i>	<i>Viola biflora</i>
<i>Draba dolomitica</i>	<i>Pedicularis kernerii</i>	<i>Viola calcarata</i>
<i>Draba dubia</i>	<i>Pedicularis oederi</i>	<i>Viola dubyana</i>



<i>Draba hoppeana</i>	<i>Pedicularis palustris</i>	<i>Viola pyrenaica</i>
<i>Draba incana</i>	<i>Pedicularis recutita</i>	<i>Viola reichenbachiana</i>
<i>Draba tomentosa</i>	<i>Pedicularis rosea</i>	<i>Viola tricolor</i>
<i>Dryas octopetala</i>	<i>Pedicularis rostrato-capitata</i>	<i>Willemetia stipitata</i>
<i>Dryopteris carthusiana</i>	<i>Pedicularis rostratospicata</i>	<i>Woodsia pulchella</i>
<i>Dryopteris dilatata</i>	<i>Petasites albus</i>	

Fauna

Elenco delle specie faunistiche potenzialmente presenti nell'ambito sciistico secondo il calcolo dell'idoneità ambientale

Dall'interpolazione dei dati ricavati dalla carta della copertura del suolo del Veneto (Edizione 2009) con i dati REN delle specie ricavati dal sito http://www.gisbau.uniroma1.it/species_sistematico.php è stata calcolata l'idoneità ambientale alla presenza delle specie nell'area oggetto di valutazione. Di seguito si riporta l'elenco delle specie ritenute idonee all'ambiente oggetto di valutazione.

ordine	famiglia	specie_lat	specie_it	L. 157/92 art. 2	L. 157/92	79/409 CEE Ap.1	79/409 CEE Ap.2/I	79/409 CEE Ap.2/II	79/409 CEE Ap.3/I	79/409 CEE Ap.3/II	BERNA Ap.2	BERNA Ap.3	CITES AII. A	CITES AII. B	CITES AII. D	BONN Ap.1	BONN Ap.2	HABITAT Ap.2	HABITAT Ap.4	HABITAT Ap.5	BARCELLONA all. 2	ENDEMICA	Area (ha)
AMPHIBIA																							
ANURA	Discoglossidae	Bombina variegata (Linnaeus, 1758)	Ululone dal ventre giallo								x							x	x				369,94
ANURA	Bufo	Bufo bufo (Linnaeus, 1758)	Rospo comune									x											372,30
ANURA	Bufo	Bufo viridis Laurenti, 1768	Rospo smeraldino								x								x				372,30
ANURA	Hylidae	Hyla intermedia Boulenger, 1882	Raganella italiana									x											369,94
ANURA	Ranidae	Rana dalmatina Bonaparte, 1840	Rana agile								x								x				369,94
ANURA	Ranidae	Rana synklepton esculenta (Linnaeus, 1758)	Rana verde																				369,94
ANURA	Ranidae	Rana temporaria Linnaeus, 1758	Rana temporaria									x									x		369,94
URODELA	Salamandridae	Salamandra atra Laurenti, 1768	Salamandra alpina								x									x			372,30
URODELA	Salamandridae	Salamandra lanzai Nascetti, Capula & Bullini, 1988	Salamandra del Lanza									x								x			377,62
URODELA	Salamandridae	Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)	Salamandra pezzata									x											372,30
URODELA	Salamandridae	Speleomantes ambrosii (Lanza,	Geotritone di									x						x	x			x	377,62

3.2.5) Obiettivi di conservazione

- Obiettivi di conservazione previsti per il sito **ZPS IT3230089**

- Tutela di *Cypripedium calceolus*, delle specie endemiche di flora e delle numerose emergenze floristiche degli ambienti rupestri, dei detriti di falda e delle praterie sommitali.
- Tutela dell'avifauna nidificante e migratrice legata agli ambienti rupestri, forestali, delle praterie e pascoli.
- Tutela di *Bombina variegata*.
- Mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture.
- Riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli ambienti agricoli. Miglioramento e creazione di habitat di interesse faunistico ai margini delle aree coltivate all'interno del sito. Conservazione dei prati e dei prati-pascolo mediante il rinnovo della vegetazione erbacea e la riduzione della vegetazione arbustiva. Mantenimento e miglioramento dei popolamenti forestali, anche in relazione alle esigenze ecologiche della fauna vertebrata ed invertebrata.
- Tutela degli ambienti umidi e dei corsi d'acqua (ambienti lentici, lotici e aree contermini), miglioramento o ripristino della vegetazione ripariale. Diminuzione dei potenziali disturbi conseguenti ai processi di urbanizzazione.
- Conservazione, miglioramento o ripristino degli ambienti di torbiera e dei prati umidi e regolamentazione delle attività antropiche.
- Tutela e conservazione degli ambienti carsici.
- Conservazione degli habitat 6150 "Formazioni erbose boreo-alpine silicee", 6170 "Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee)", 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)", 6520 "Praterie montane da fieno", 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*", 9150 "Faggeti calcicoli dell'Europa Centrale del *Cephalanthero-Fagion*", 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*), 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*", 9530 "Pinete (sub-mediterranee di pini neri endemici", 9180 "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*", 3220 "Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea", 3230 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*", 3240 "Fiumi alpini con vegetazione



riparia legnosa a *Salix eleagnos*”, 4080 “Boscaglie subartiche di *Salix* spp.”, 7110 “Torbiere alte attive”, 7140 “Torbiere di transizione e instabili”, 7150 “Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*”, 7230 “Torbiere basse alcaline”, 7240 “Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*”, 91D0 “Torbiere boschive”, 6410 “Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)”, 6430 “Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile”, 4060 “Lande alpine e boreali”, 4070 “Boscaglie di *Pino mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)”, 8110 “Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*)”, 8120 “Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)”, 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”, 8230 “Rocce silicee con vegetazione pioniera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*”, 8220 “Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica”, 8240 “Pavimenti calcarei”.

3.3) Identificazione degli aspetti vulnerabili dei siti considerati

3.3.1) Vulnerabilità degli habitat di interesse comunitario

Nella tabella seguente si riporta l'analisi dell'intensità di occupazione dell'ambito sciistico A04 Monte Ferro sugli habitat comunitari dei siti della Rete Natura 2000 coinvolti.

ZPS IT3230089	
Habitat comunitari interessati dall'ambito (ha)	295,56
⁽¹⁾ Percentuale presenza di habitat comunitari nell'ambito (%)	77,78
⁽²⁾ Percentuale di presenza di habitat comunitari sull'area ZPS coinvolta dall'ambito (%)	79,63

NOTE:

⁽¹⁾ : Calcolato come rapporto percentuale tra gli habitat comunitari interessati dall'ambito e l'area dell'ambito stesso

⁽²⁾ : Calcolato come rapporto percentuale tra gli habitat comunitari interessati dall'ambito e l'area del sito Natura 2000 coinvolto dall'ambito



La vulnerabilità degli habitat di interesse comunitario è stata valutata riferendosi agli interventi previsti nell'ambito sciistico A04 Monte Ferro e al sito Natura 2000 IT3230089.

Al fine di delineare la vulnerabilità degli habitat di interesse comunitario, sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti ricavabili dalle informazioni riportate nella cartografia degli habitat approvata con DGR n. 4240 del 30 dicembre 2008:

- superficie di habitat interna all'area di impatto potenziale;
- superficie totale di habitat presente nel sito;
- stato di conservazione dell'habitat nel sito.

Nello specifico, si ritiene che la vulnerabilità degli habitat di interesse comunitario sia inversamente proporzionale al grado di conservazione e direttamente proporzionale alla superficie coinvolta in rapporto alla superficie del medesimo habitat all'interno del sito.

A questo proposito sono stati attribuiti dei punteggi al grado di conservazione ed al rapporto superficie di habitat coinvolto/superficie di habitat nel sito, in modo da ottenere la vulnerabilità come somma dei due parametri considerati.

Grado di conservazione*	Punteggio
Conservazione eccellente	1
Conservazione buona	2
Conservazione media o ridotta	3
Conservazione non valutabile	3

(* Nella cartografia approvata con DGR n. 4240 del 30 dicembre 2008, ad ogni habitat è stato attribuito un punteggio riferito allo stato di conservazione globale. Lo stato di conservazione globale rappresenta la sintesi di una serie di attributi quali la struttura dell'habitat, la conservazione delle funzioni, intesa come capacità e possibilità di un mantenimento futuro della struttura dell'habitat, e la possibilità di ripristino dell'habitat per stabilizzarne o accrescerne la percentuale di copertura. Esso può assumere i seguenti valori

-1: **non valutabile** - necessaria una verifica diretta oppure impossibile identificare l'habitat della feature;

0: **non valutabile** - feature di ambiti urbanizzati;

1: **conservazione media o ridotta;**



2: **conservazione buona;**

3, **conservazione eccellente.**

Nel metodo impiegato per la definizione della vulnerabilità, al grado di conservazione ridotto è stato attribuito il punteggio maggiore (3), mentre al grado di conservazione eccellente è stato attribuito il punteggio minore (1). Inoltre, a scopo precauzionale, agli habitat contraddistinti da uno stato di conservazione non valutabile, è stato assegnato il punteggio 3).

Rapporto superficie coinvolta / superficie all'interno del sito (%) (A/B)*100	Punteggio
1-20	1
21-40	2
41-60	3
61-80	4
81-100	5

La vulnerabilità degli habitat, pertanto, può variare entro i valori compresi tra 2 e 8. Tali valori possono essere suddivisi secondo la seguente classificazione:

Vulnerabilità	Punteggio
2	Molto bassa
3-4	Bassa
5-6	Media
7-8	Alta

Pertanto, la massima vulnerabilità di un habitat si manifesta nel momento in cui gran parte della superficie del medesimo ricade all'interno dell'area di studio e, contestualmente, esso è caratterizzato da un grado di conservazione basso.

Al contrario, la vulnerabilità dell'habitat è limitata nel caso in cui all'interno dell'area di studio ricada una ridotta superficie dello stesso ed il grado di conservazione sia buona o eccellente.



La superficie dell'habitat ricadente all'interno dell'area di analisi è stata desunta dall'analisi della cartografia degli habitat. Va precisato che nel calcolo della superficie dell'habitat all'interno del sito IT3230089, si sono considerate solo quelle aree nelle quali lo stesso è presente in maniera esclusiva o in maniera dominante nel caso di mosaico con altri habitat.

Applicazione del metodo per l'identificazione della vulnerabilità degli habitat di interesse comunitario coinvolti nell'ambito sciistico

Habitat	Superficie in area di studio (ha) A	Superficie nel sito IT3230089 (ha) B	Rapporto A/B (%)		Grado di conservazione		Vulnerabilità
3240	1,17	292,15	0,40	1	Medio o ridotta	3 4	Bassa
4060	12,15	2104,32	0,58	1	Buono	2 3	Bassa
4070	15,93	9051,91	0,18	1	Buono	2 3	Bassa
6150	1,96	1817,53	0,11	1	Eccellente	1 2	Molto bassa
6170	21,07	3213,49	0,66	1	Buono	2 3	Bassa
6520	57,89	557,75	10,38	1	Medio o ridotta	3 4	Bassa
7230	1,50	66,93	2,24	1	Buono	2 3	Bassa
8110	0,32	93,63	0,35	1	Eccellente	1 2	Molto bassa
8120	0,71	3807,98	0,02	1	Buono	2 3	Bassa
8210	4,31	8814,87	0,05	1	Buono	2 3	Bassa
91E0	0,10	242,97	0,04	1	Non valutabile	3 4	Bassa
91K0	2,60	1597,91	0,16	1	Non valutabile	3 4	Bassa
9410	116,58	19437,15	0,60	1	Eccellente	1 2	Molto bassa
9420	59,27	5958,94	0,99	1	Buono	2 3	Bassa

La vulnerabilità degli habitat con riferimento all'area di incidenza potenziale risulta bassa per tutti gli habitat ad eccezione degli habitat 6150, 8110 e 9410 per i quali risulta molto bassa. Questo risultato è determinato, principalmente, dall'esiguità delle superfici di habitat

coinvolte indirettamente dal piano in esame, e dal fatto che il grado di conservazione degli habitat è mediamente buono.

3.3.2) Vulnerabilità delle specie di interesse comunitario

Per la definizione della vulnerabilità delle specie coinvolte è stato calcolato l'indice di vulnerabilità (**VuS**) di Storie - Villa (Storie R. E., 1976; Koreleski K., 1988, in ARILLO, s.d.).

Vulnerabilità secondo Storie-Villa

Il metodo di Storie consente il calcolo di vari indicatori tra i quali, ai fini del presente studio, è stato calcolato l'indicatore Vulnerabilità della specie (**VuS**). Tale indicatore stima il rischio che una specie possa slittare verso uno status di conservazione peggiore dell'attuale. Valori elevati di **VuS** indicano specie che, in presenza di inadeguati modelli gestionali del territorio, vanno incontro a pericolose perdite di areale, od a gravi danni allo status di conservazione delle popolazioni.

Pertanto, secondo ARILLO (s.d.), l'indicatore può essere calcolato sulla base dei seguenti parametri:

A2, fattore categoria diffusione - Frequenza/abbondanza della specie;

A5, fattore tipologia di sensibilità e di rischio (fragilità) - Fragilità della specie.

La vulnerabilità di una specie (**VuS**) è funzione della sua frequenza e della sua fragilità; una specie è tanto più vulnerabile quanto più è rara e fragile

L'indicatore è calcolato come distanza dall'origine in uno spazio euclideo individuato da assi che rappresentano i parametri individuati. Dato che i parametri variano tra i valori 1-5 e volendo riportare tale misura di distanza in un campo 1-5, la formula da utilizzare è la seguente:

$$VuS = \sqrt{\frac{(A2-1)^2 + (A5-1)^2}{2}} + 1$$

Nelle seguenti **Matrice 1** e **Matrice 2**, sono riportati i criteri per attribuire il valore dei fattori A2 e A5 alle singole specie.



Matrice 1: Criteri per l'attribuzione del punteggio al fattore A2, categoria diffusione.

Fattore categoria diffusione A2	punteggio
diffuso e comune	1
diffuso in tutto il territorio regionale, ma raro oppure comune nella Regione considerata, ma ivi diffuso solo in areali ristretti	2
noto per non più di 10 località della regione considerata; oppure raro in Italia per numero/consistenza di popolazioni	3
noto per non più di 10 località italiane; oppure le popolazioni presenti nella Regione considerata sono le uniche popolazioni italiane	4
noto per non più di 10 località europee; oppure raro in assoluto a livello globale	5

Matrice 2 : Criteri per l'attribuzione del punteggio al fattore A5, tipologia di sensibilità e di rischio (fragilità).

Fattore tipologia di sensibilità e di rischio (fragilità) A5	punteggio
nessuno o sconosciuta	1
sensibile a processi di evoluzione naturale	2
sensibile a pressioni antropiche	3
sensibile a alterazioni ambientali a causa di isolamento genetico; oppure a rischio per eccessivo prelievo a scopi collezionistici, oppure minacciato di estinzione perché sensibile a modificazioni ambientali che sono in costante espansione a livello regionale	4
minacciato di estinzione in Italia perché sensibile a modificazioni ambientali che sono in costante espansione	5

La vulnerabilità specifica **VuS**, calcolata secondo il metodo esposto in precedenza, può assumere valori compresi tra 1 e 5. Per la classificazione della vulnerabilità delle specie si è deciso di utilizzare la seguente codifica:

**Tabella:** Classificazione della Vulnerabilità delle specie (VuS)**Vulnerabilità delle specie**

Punteggio	Dato qualitativo	Scala cromatica
$1,00 \leq VuS < 2,00$	Bassa	
$2,00 \leq VuS < 3,00$	Media	
$3,00 \leq VuS < 4,00$	Alta	
$4,00 \leq VuS \leq 5,00$	Molto Alta	

Applicazione del metodo per il calcolo della vulnerabilità alle specie coinvolte dall'ambito sciistico (area di valutazione)

Per l'attribuzione dei punteggi per i fattori A2 e A5, e quindi procedere con l'applicazione del metodo di calcolo della vulnerabilità alle specie coinvolte dall'ambito sciistico, sono state raccolte ed esaminate le informazioni per ciascuna specie coinvolta con riferimento alla precisa area in esame. In particolare le informazioni per ciascuna specie derivano dalle valutazioni riportate nella bibliografia consultata, quale: materiale bibliografico della Program s.r.l., Gestione Dati Faunistici Provincia Belluno www.faunabl.mpasol.it, dati ricavabili dalla rete ecologica nazionale www.gisbau.uniroma1.it

Nella tabella seguente si riportano i punteggi di vulnerabilità delle specie calcolati nell'area di studio.

Classe	Nome scientifico	Nome comune	VuS	
AVES	<i>Accipiter gentilis</i>	Astore	2,58	Media
AVES	<i>Accipiter nisus</i>	Sparviere	2,58	Media
AVES	<i>Aegithalos caudatus</i>	Codibugnolo	1,71	Bassa
AVES	<i>Aegolius funereus</i>	Civetta capogrosso	1,71	Bassa
AVES	<i>Alectoris graeca</i>	Coturnice	3,55	Alta
MAMMALIA	<i>Amblyotus nilssonii</i>	Amblyotus nilssonii	2,41	Media
AVES	<i>Anas platyrhynchos</i>	Germano reale	1,00	Bassa
REPTILIA	<i>Anguis fragilis</i>	Orbettino	2,41	Media
AVES	<i>Anthus campestris</i>	Calandro	2,41	Media
AVES	<i>Anthus spinoletta</i>	Spioncello	1,71	Bassa
AVES	<i>Anthus trivialis</i>	Prispolone	1,71	Bassa
MAMMALIA	<i>Apodemus alpicola</i>	Topo selvatico alpino	1,00	Bassa



		Topo selvatico dal collo		
MAMMALIA	<i>Apodemus flavicollis</i>	giallo	1,71	Bassa
MAMMALIA	<i>Apodemus sylvaticus</i>	Topo selvatico	1,00	Bassa
AVES	<i>Apus apus</i>	Rondone	1,00	Bassa
AVES	<i>Apus melba</i>	Rondone maggiore	1,00	Bassa
AVES	<i>Aquila chrysaetos</i>	Aquila reale	3,55	Alta
AVES	<i>Asio otus</i>	Gufo comune	2,58	Media
AVES	<i>Athene noctua</i>	Civetta	1,71	Bassa
MAMMALIA	<i>Barbastella barbastellus</i>	Barbastello	1,71	Bassa
AMPHIBIA	<i>Bombina variegata</i>	Ululone dal ventre giallo	3,55	Alta
AVES	<i>Bonasa bonasia</i>	Francolino di monte	2,58	Media
AVES	<i>Bubo bubo</i>	Gufo reale	1,71	Bassa
AMPHIBIA	<i>Bufo bufo</i>	Rospo comune	1,71	Bassa
AMPHIBIA	<i>Bufo viridis</i>	Rospo smeraldino	2,41	Media
AVES	<i>Buteo buteo</i>	Poiana	2,41	Media
MAMMALIA	<i>Capra ibex</i>	Stambecco	3,55	Alta
MAMMALIA	<i>Capreolus capreolus</i>	Capriolo	2,41	Bassa
AVES	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	2,41	Media
AVES	<i>Carduelis cannabina</i>	Fanello	2,00	Media
AVES	<i>Carduelis carduelis</i>	Cardellino	2,58	Media
AVES	<i>Carduelis chloris</i>	Verdone comune	2,00	Media
AVES	<i>Carduelis flammea</i>	Organetti	1,71	Bassa
AVES	<i>Carduelis spinus</i>	Lucherino euroasiatico	1,71	Bassa
AVES	<i>Certhia brachydactyla</i>	Rampichino	1,71	Bassa
AVES	<i>Certhia familiaris</i>	Rampichino alpestre	1,71	Bassa
AVES	<i>Charadrius morinellus</i>	Pivere tortolino	3,55	Alta
MAMMALIA	<i>Chionomys nivalis</i>	Arvicola delle nevi	1,71	Bassa
MAMMALIA	<i>Clethrionomys glareolus</i>	Arvicola rossastra	1,00	Bassa
AVES	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Frosone	2,58	Media
REPTILIA	<i>Coluber viridiflavus</i>	Biacco	2,00	Media
AVES	<i>Columba livia</i>	Piccione selvatico	1,00	Bassa
AVES	<i>Columba palumbus</i>	Colombaccio	1,00	Bassa
REPTILIA	<i>Coronella austriaca</i>	Coronella	2,41	Media
AVES	<i>Corvus corax</i>	Corvo imperiale	1,00	Bassa
AVES	<i>Corvus corone</i>	Cornacchia	1,00	Bassa
AVES	<i>Corvus monedula</i>	Taccola	2,00	Media
AVES	<i>Coturnix coturnix</i>	Quaglia	2,58	Media
MAMMALIA	<i>Crocidura leucodon</i>	Crocidura ventre bianco	1,00	Bassa
MAMMALIA	<i>Crocidura suaveolens</i>	Crocidura minore	1,00	Bassa
AVES	<i>Cuculus canorus</i>	Cuculo	2,58	Media
AVES	<i>Delichon urbica</i>	Balestruccio	2,58	Media
AVES	<i>Dryocopus martius</i>	Picchio nero	1,71	Bassa
MAMMALIA	<i>Dryomys nitedula</i>	Driomio	1,71	Bassa
REPTILIA	<i>Elaphe longissima</i>	Saettone	1,00	Bassa
MAMMALIA	<i>Eliomys quercinus</i>	Quercino	2,00	Media
AVES	<i>Emberiza cia</i>	Zigolo muciatto	2,00	Media
AVES	<i>Emberiza citrinella</i>	Zigolo giallo	1,00	Bassa
AVES	<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolano	3,55	Alta
MAMMALIA	<i>Eptesicus serotinus</i>	Serotino comune	2,00	Media
MAMMALIA	<i>Erinaceus concolor</i>	Riccio	1,71	Bassa



MAMMALIA	<i>Erinaceus europaeus</i>	Riccio	1,71	Bassa
AVES	<i>Erithacus rubecula</i>	Pettiroso	1,00	Bassa
AVES	<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	2,00	Media
AVES	<i>Falco tinnunculus</i>	Gheppio	2,41	Media
AVES	<i>Ficedula albicollis</i>	Balia dal collare	2,58	Media
AVES	<i>Fringilla coelebs</i>	Fringuello	2,41	Media
AVES	<i>Fulica atra</i>	Folaga	1,71	Bassa
AVES	<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinella d'acqua	1,71	Bassa
AVES	<i>Garrulus glandarius</i>	Ghiandaia	1,71	Bassa
AVES	<i>Glaucidium passerinum</i>	Civetta nana	1,71	Bassa
AVES	<i>Hirundo rustica</i>	Rondine	1,71	Bassa
AMPHIBIA	<i>Hyla intermedia</i>	Raganella italiana	1,71	Bassa
MAMMALIA	<i>Hypsugo savii</i>	Pipistrello di Savi	2,00	Media
AVES	<i>Jynx torquilla</i>	Torcicollo	2,58	Media
REPTILIA	<i>Lacerta viridis</i>	Ramarro	1,71	Bassa
AVES	<i>Lagopus mutus helveticus</i>	Pernice bianca	3,24	Alta
AVES	<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	3,24	Alta
MAMMALIA	<i>Lepus europaeus</i>	Lepre comune	2,58	Media
MAMMALIA	<i>Lepus timidus</i>	Lepre bianca	2,41	Media
AVES	<i>Loxia curvirostra</i>	Crociere	1,71	Bassa
AVES	<i>Lullula arborea</i>	Tottavilla	2,58	Media
AVES	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Usignolo	3,00	Alta
MAMMALIA	<i>Lynx lynx</i>	Lince euroasiatica	3,55	Alta
MAMMALIA	<i>Marmota marmota</i>	Marmotta delle alpi	2,41	Media
MAMMALIA	<i>Martes foina</i>	Faina	2,58	Media
MAMMALIA	<i>Martes martes</i>	Martora	3,00	Alta
MAMMALIA	<i>Meles meles</i>	Tasso	2,58	Media
MAMMALIA	<i>Microtus agrestis</i>		1,00	Bassa
MAMMALIA	<i>Microtus arvalis</i>		1,00	Bassa
MAMMALIA	<i>Microtus multiplex</i>		2,58	Media
MAMMALIA	<i>Microtus savii</i>		1,00	Bassa
MAMMALIA	<i>Microtus subterraneus</i>		1,00	Bassa
AVES	<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno	3,55	Alta
MAMMALIA	<i>Miniopterus schreibersi</i>		2,41	Media
AVES	<i>Monticola saxatilis</i>	Codirossone	1,71	Bassa
AVES	<i>Monticola solitarius</i>	Passero solitario	1,71	Bassa
AVES	<i>Montifringilla nivalis</i>	Fringuello alpino	1,71	Bassa
AVES	<i>Motacilla alba</i>	Ballerina bianca	1,71	Bassa
AVES	<i>Motacilla cinerea</i>	Ballerina gialla	1,71	Bassa
MAMMALIA	<i>Mus domesticus</i>	Topo domestico	1,00	Bassa
MAMMALIA	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Moscardino	2,58	Media
AVES	<i>Muscicapa striata</i>	Pigliamosche	1,71	Bassa
MAMMALIA	<i>Mustela erminea</i>	Ermellino	2,58	Media
MAMMALIA	<i>Mustela nivalis</i>	Donnola	2,58	Media
MAMMALIA	<i>Mustela putorius</i>	Puzzola	3,00	Alta
MAMMALIA	<i>Myotis bechsteini</i>	Vespertilio di Bechstein	2,00	Media
MAMMALIA	<i>Myotis brandti</i>	Vespertilio di Brandt	2,00	Media
		Vespertilio di		
MAMMALIA	<i>Myotis daubentoni</i>	Daubenton	2,00	Media
MAMMALIA	<i>Myotis emarginatus</i>	Vespertilio smarginato	2,00	Media



MAMMALIA	<i>Myotis myotis</i>	Vespertilio maggiore	2,00	Media
MAMMALIA	<i>Myotis mystacinus</i>	Vespertilio mustacchino	2,00	Media
MAMMALIA	<i>Myotis nattereri</i>	Vespertilio di Natterer	2,00	Media
REPTILIA	<i>Natrix natrix</i>	Natrice dal collare	2,41	Media
REPTILIA	<i>Natrix tessellata</i>	Natrice tassellata	2,41	Media
MAMMALIA	<i>Neomys anomalus</i>	Toporagno d'acqua	1,71	Bassa
MAMMALIA	<i>Neomys fodiens</i>	Toporagno d'acqua	1,00	Bassa
AVES	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Nocciolaia	1,71	Bassa
MAMMALIA	<i>Nyctalus lasiopterus</i>	Nottola gigante	1,71	Bassa
MAMMALIA	<i>Nyctalus leisleri</i>	Nottola di Leisler	2,00	Media
MAMMALIA	<i>Nyctalus noctula</i>	Nottola comune	2,00	Media
AVES	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Culbianco	2,00	Media
AVES	<i>Oriolus oriolus</i>	Rigogolo	2,41	Media
		Coniglio selvatico		
MAMMALIA	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	europeo	2,58	Media
AVES	<i>Otus scops</i>	Assiolo	2,58	Media
MAMMALIA	<i>Ovis orientalis</i>	Muflone	3,24	Alta
AVES	<i>Parus ater</i>	Cincia mora	2,41	Media
AVES	<i>Parus caeruleus</i>	Cinciarella	1,00	Bassa
AVES	<i>Parus cristatus</i>	Cincia dal ciuffo	2,00	Media
AVES	<i>Parus major</i>	Cinciallegra	1,71	Bassa
AVES	<i>Parus montanus</i>	Cincia bigia alpestre	2,00	Media
AVES	<i>Parus palustris</i>	Cincia bigia	1,71	Bassa
AVES	<i>Passer domesticus</i>	Passera oltremontana	2,00	Media
AVES	<i>Passer italiae</i>	Passera d'Italia	2,00	Media
AVES	<i>Passer montanus</i>	Passera mattugia	1,00	Bassa
AVES	<i>Perdix perdix</i>	Starna	1,71	Bassa
AVES	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	2,58	Media
AVES	<i>Phasianus colchicus</i>	Fagiano comune	1,00	Bassa
		Codirosso		
AVES	<i>Phoenicurus ochruros</i>	spazzacamino	2,00	Media
AVES	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Codirosso	2,00	Media
AVES	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Luì bianco	1,71	Bassa
AVES	<i>Phylloscopus collybita</i>	Luì piccolo	2,58	Media
AVES	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Luì verde	2,41	Media
AVES	<i>Pica pica</i>	Gazza	1,00	Bassa
AVES	<i>Picoides leucotos</i>	Picchio dorsobianco	1,71	Bassa
AVES	<i>Picoides major</i>	Picchio rosso maggiore	2,58	Media
AVES	<i>Picoides minor</i>	Picchio rosso minore	2,00	Media
AVES	<i>Picoides tridactylus</i>	Picchio tridattilo	3,55	Alta
AVES	<i>Picus canus</i>	Picchio cinerino	3,55	Alta
AVES	<i>Picus viridis</i>	Picchio verde	2,00	Media
MAMMALIA	<i>Pipistrellus kuhli</i>	Pipistrello albolimbato	2,58	Media
MAMMALIA	<i>Pipistrellus nathusii</i>	Pipistrello di Nathusius	2,58	Media
MAMMALIA	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Pipistrello nano	2,00	Media
MAMMALIA	<i>Plecotus auritus</i>	Orecchione comune	2,00	Media
REPTILIA	<i>Podarcis muralis</i>	Lucertola muraiola	1,00	Bassa
AVES	<i>Prunella collaris</i>	Sordone	1,71	Bassa
AVES	<i>Prunella modularis</i>	Passera scopaiola	1,71	Bassa
AVES	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Rondine montana	1,71	Bassa



AVES	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	Gracchio alpino	1,00	Bassa
AVES	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	Gracchio corallino	1,00	Bassa
AVES	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Ciuffolotto	2,00	Media
AMPHIBIA	<i>Rana dalmatina</i>	Rana agile	1,71	Bassa
AMPHIBIA	<i>Rana synklepton esculenta</i>	Rana verde	1,71	Bassa
AMPHIBIA	<i>Rana temporaria</i>	Rana temporaria	1,71	Bassa
MAMMALIA	<i>Rattus norvegicus</i>		1,00	Bassa
MAMMALIA	<i>Rattus rattus</i>		1,00	Bassa
AVES	<i>Regulus ignicapillus</i>	Fiorrancino	2,00	Media
AVES	<i>Regulus regulus</i>	Regolo	2,00	Media
		Ferro di cavallo		
MAMMALIA	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	maggiore	1,71	Bassa
MAMMALIA	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Ferro di cavallo minore	2,00	Media
		Ferro di cavallo di		
MAMMALIA	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	Mehely	2,00	Media
MAMMALIA	<i>Rupicapra rupicapra</i>	Camoscio	3,55	Alta
AMPHIBIA	<i>Salamandra atra</i>	Salamandra alpina	2,00	Media
AMPHIBIA	<i>Salamandra lanzai</i>	Salamandra del Lanza	3,00	Alta
AMPHIBIA	<i>Salamandra salamandra</i>	Salamandra pezzata	4,00	Media
AVES	<i>Saxicola rubetra</i>	Stiaccino	1,71	Bassa
AVES	<i>Saxicola torquata</i>	Saltimpalo	1,71	Bassa
MAMMALIA	<i>Sciurus vulgaris</i>	Scoiattolo comune	2,00	Media
AVES	<i>Scolopax rusticola</i>	Beccaccia	2,58	Media
AVES	<i>Serinus citrinella</i>	Venturone	1,00	Bassa
AVES	<i>Serinus serinus</i>	Verzellino	2,58	Media
AVES	<i>Sitta europaea</i>	Picchio muratore	2,00	Media
MAMMALIA	<i>Sorex alpinus</i>	Toporagno alpino	1,00	Bassa
MAMMALIA	<i>Sorex araneus</i>	Toporagno comune	2,41	Media
MAMMALIA	<i>Sorex minutus</i>	Toporagno nano	2,41	Media
AMPHIBIA	<i>Speleomantes ambrosii</i>	Geotritone di Ambrosi	2,00	Media
AVES	<i>Streptopelia turtur</i>	Tortora	1,00	Bassa
AVES	<i>Strix aluco</i>	Allocco	2,58	Media
AVES	<i>Sturnus vulgaris</i>	Storno	1,00	Bassa
MAMMALIA	<i>Sus scrofa</i>	Cinghiale	3,00	Alta
AVES	<i>Sylvia atricapilla</i>	Capinera	2,58	Media
AVES	<i>Sylvia borin</i>	Beccafico	2,58	Media
AVES	<i>Sylvia communis</i>	Sterpazzola	2,00	Media
		Sterpazzola di		
AVES	<i>Sylvia conspicillata</i>	Sardegna	2,00	Media
AVES	<i>Sylvia curruca</i>	Bigiarella	2,00	Media
AVES	<i>Sylvia melanocephala</i>	Occhiocotto	2,58	Media
AVES	<i>Sylvia nisoria</i>	Bigia padovana	2,00	Media
MAMMALIA	<i>Tadarida teniotis</i>	Molosso di Cestoni	2,00	Media
MAMMALIA	<i>Talpa caeca</i>		1,00	Bassa
MAMMALIA	<i>Talpa europaea</i>		1,00	Bassa
MAMMALIA	<i>Talpa romana</i>		1,00	Bassa
AVES	<i>Tetrao tetrix tetrix</i>	Fagiano di monte	2,00	Media
AVES	<i>Tetrao urogallus</i>	Gallo cedrone	3,00	Alta
AVES	<i>Tichodroma muraria</i>	Picchio muraiolo	2,00	Media



AMPHIBIA	<i>Triturus alpestris</i>	Tritone alpestre	2,00	Media
AMPHIBIA	<i>Triturus carnifex</i>	Tritone crestato italiano	2,00	Media
AMPHIBIA	<i>Triturus vulgaris</i>	Tritone punteggiato	1,71	Bassa
AVES	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Scricciolo	1,71	Bassa
AVES	<i>Turdus merula</i>	Merlo	1,00	Bassa
AVES	<i>Turdus philomelos</i>	Tordo bottaccio	2,58	Media
AVES	<i>Turdus pilaris</i>	Cesena	1,71	Bassa
AVES	<i>Turdus torquatus</i>	Merlo dal collare	1,71	Bassa
AVES	<i>Turdus viscivorus</i>	Tordela	2,00	Media
AVES	<i>Tyto alba</i>	Barbagianni	2,58	Media
AVES	<i>Upupa epops</i>	Upupa	3,00	Alta
MAMMALIA	<i>Ursus arctos</i>	Orso bruno	4,00	Alta
AVES	<i>Vanellus vanellus</i>	Pavoncella	2,58	Media
MAMMALIA	<i>Vespertilio murinus</i>	Serotino bicolore	1,00	Bassa
REPTILIA	<i>Vipera ammodytes</i>	Vipera dal corno	2,58	Media
REPTILIA	<i>Vipera aspis</i>	Vipera comune	1,00	Bassa
REPTILIA	<i>Vipera berus</i>	Marasso	3,55	Alta
MAMMALIA	<i>Vulpes vulpes</i>	Volpe	2,58	Media
REPTILIA	<i>Zootoca vivipara</i>	Lucertola vivipara	2,00	Media

Tabella. Vulnerabilità delle specie di interesse comunitario presenti nell'area di analisi.

3.4) Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie

In accordo con quanto stabilito dalla DGR 3173/2006, si presenta nelle pagine seguenti la valutazione delle possibili incidenze del piano considerato in precedenza sui Siti Natura 2000. Applicando una serie di indicatori, scelti in base ad un giudizio esperto e considerati tra i più idonei per stimare l'esistenza di possibili incidenze, si procede all'esame dei possibili effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei quali si producono le azioni del piano.

Benché consapevoli dell'esistenza di altri indicatori, alternativi o sostitutivi a quelli elencati, si ritiene che questi siano sufficienti per questo livello di valutazione.

Si fa presente che in questo livello di pianificazione i fattori perturbativi legati alle azioni del piano si limitano alla potenziale “**Riduzione dello spazio fisico** (dovuta alla potenziale realizzazione di nuove piste da sci, impianti di risalita)”.

Nella seguente tabella si riportano i fattori perturbativi e vengono identificati gli effetti perturbativi (da E1 a E8) con riferimento agli habitat e ai gruppi di specie nei confronti dei quali si producono le azioni del piano.



Soggetti coinvolti:	Fattori perturbativi	Effetti perturbativi							
	Riduzione dello spazio fisico	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8
E1 = Perdita di superficie di habitat e di specie									
E2 = Frammentazione di superficie di habitat e di habitat di specie									
E3 = Perdita di specie di interesse conservazionistico									
E4 = Perturbazione alle specie della flora e della fauna									
E5 = Diminuzione della densità di popolazione									
E6 = Alterazione della qualità dell'aria									
E7 = Alterazione della qualità del suolo									
E8 = Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e la funzionalità dei siti									
Uccelli	X	X	X						
Mammiferi	X	X	X						
Anfibi	X	X	X						
Rettili	X	X	X						
Habitat	X	X	X						

Si fa notare che non sono state prese in considerazioni le specie vegetali in quanto non direttamente e/o indirettamente coinvolte dalle azioni del piano.

3.5) Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi

Dallo studio dei piani, progetti e interventi si è verificato che **NON sussistono effetti negativi** derivanti dalla commistione reciproca tra il PRN per l'ambito-demanio sciistico A04 Monte Ferro ed i piani stessi. Non si verificano effetti negativi che traggano origine dall'eventuale commistione reciproca o con ulteriori piani o progetti insistenti sull'area.

3.6) Identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali gli effetti si possono produrre

Nella presente relazione si può solo ipotizzare che gli interventi previsti nel piano potrebbero determinare principalmente effetti legati alla riduzione dello spazio fisico, con conseguente disturbo alle specie e possibile riduzione e/o frammentazione di habitat. Il principale vettore di tale effetto è rappresentato dal suolo, sul quale si manifesta la riduzione dello spazio fisico in seguito alla realizzazione degli interventi legati alle attività sciistiche.



3.7) Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie

Valutazione della significatività dell'incidenza con riferimento alle specie coinvolte

Il metodo che si propone per la valutazione della significatività dell'incidenza con riferimento alle specie coinvolte deriva dalla esperienza della Program s.r.l., la quale è consolidata negli anni e collaudata in molteplici valutazioni similari a questa. Questo metodo inoltre si basa su principi ormai acquisiti dagli “addetti ai lavori”; difatti definire la significatività dell'incidenza quale prodotto della gravità dei fattori perturbativi per la vulnerabilità della specie è un principio verificato e riconosciuto.

Il giudizio di significatività dell'incidenza attribuito alle azioni del piano si ottiene predisponendo una funzione che mette in relazione due fattori:

1- la significatività dell'incidenza (**S**) quale prodotto tra la gravità dei fattori perturbativi (**G**) e il valore di vulnerabilità delle specie (**P**)

$$\mathbf{S = G \times P}$$

S = Significatività dell'incidenza

G = Gravità dei fattori perturbativi (valore di pressione attribuito all'impatto negativo)

P = Valore di vulnerabilità per le specie

2- Il rapporto percentuale (**R**) tra la superficie degli habitat di specie coinvolti dalle nuove aree sciabili e la superficie di tutti gli habitat di specie idonei ad ospitare la stessa specie presenti nel sito della Rete Natura 2000 coinvolto dall'ambito demaniale.

Nella seguente valutazione della significatività dell'incidenza non sono state considerate le specie vegetali elencate, in quanto, pur essendo presenti nelle aree di analisi, non sono direttamente e/o indirettamente coinvolti dai fattori perturbativi.



1- S = SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA

Il valore di significatività (S) attribuito alle azioni del piano viene calcolato predisponendo una matrice che relaziona i valori di gravità dell'effetto (G) al valore di vulnerabilità delle specie “effettivamente presenti” nell'area di analisi (P).

Si calcola il valore di significatività dell'incidenza per ciascun fattore perturbativo (occupazione del suolo) mediante il prodotto tra il valore di vulnerabilità delle specie (P) e la gravità del fattore perturbativo (G).

$$S = G \times P$$

S = Significatività dell'incidenza

G = Gravità dei fattori perturbativi (valore di pressione attribuito all'impatto negativo)

P = Valore di vulnerabilità per le specie

I valori di significatività possono assumere valori compresi tra 0 e 15.

G = VALORI DI PRESSIONE (GRAVITÀ) DEI FATTORI PERTURBATIVI DOVUTE ALLE AZIONI DEL PIANO SULLE COMPONENTI AMBIENTALI

Per gravità dell'effetto (G) si intende la misura in cui i fattori perturbativi (nella fattispecie l'occupazione del suolo) dovute alle azioni previste nel piano incidono sulle componenti ambientali (specie faunistiche).

G - Occupazione del suolo

Premessa

La frammentazione in seguito all'occupazione antropica del territorio può essere definita come il processo che genera una progressiva riduzione della superficie degli ambienti naturali e un aumento del loro isolamento.

Le superfici naturali vengono così a costituire frammenti spazialmente isolati inseriti in una matrice territoriale di origine antropica (ecomosaico).

Il processo di frammentazione del territorio ha portato alla strutturazione di “ecomosaici” (Forman, 1995) a diverso grado di eterogeneità. In essi si possono distinguere:

- una matrice antropica, venutasi a formare per scomparsa ed alterazione di ambienti naturali;
- frammenti di ambiente naturale (patches), distinguibili in base alla loro area, morfologia e qualità ambientale;
- ambienti di margine (edge habitat).

Le indagini compiute nell'ambito della biologia della conservazione hanno chiaramente messo in luce come questo fenomeno possa influenzare la fauna, la vegetazione nonché le condizioni ecologiche degli ambienti così isolati.

Ogni struttura insediativa esprime caratteri latenti di frammentazione tipologicamente caratterizzabili nei confronti del proprio dominio ambientale di incidenza, tali caratteri, possono evidenziarsi e/o amplificarsi in relazione alle specifiche condizioni storico-culturali e socio-economiche di ciascun territorio.

Tra le principali cause di alterazioni della struttura ecologica e del paesaggio vengono rilevati i seguenti fenomeni: insediativi; infrastrutturali della mobilità; infrastrutturali tecnologici (es. le linee aeree per il trasporto di energia, opere per la regimazione idraulica dei corsi d'acqua e la difesa idrogeologica degli insediamenti, opere per le trasmissioni elettromagnetiche, ecc.); e produttivi (es. le monocolture agrarie estese, l'escavazione o lo stoccaggio finale di inerti, le strutture commerciali e terziarie localizzate in prossimità dei nodi della rete di viabilità primaria).

In generale, il fenomeno della frammentazione da urbanizzazione è estremamente complesso da gestire, sia per motivi legati alla tipologia degli interventi, che esigono un'approccio di tipo interdisciplinare, sia per la forte implicazione di interessi privati.

Per questo motivo è essenziale che gli strumenti di pianificazione prevedano a monte della loro applicazione adeguate strategie d'intervento capaci di arginare e/o mitigare, per quanto sia possibile, la voracità delle dinamiche evolutive urbane contemporanee.

Stima del valore di pressione Occupazione del Suolo

Dalle considerazioni qui sopra esposte possiamo individuare tre classi di pressione sulla fauna in seguito all'occupazione del suolo. Alle tre classi sono stati attribuiti valori di pressione diversi.



Valore di pressione (G)	di Effetti indotti sulla fauna
3	Effetti gravi. Dovuti all'occupazione fisica del suolo. Rappresenta un impatto diretto, in quanto l'occupazione del suolo dalle attività antropiche comportano l'abbandono, seppur temporaneo, degli habitat di specie dalla componente faunistica.
2	Effetti importanti. Dovuti alla propagazione del disturbo (impatto visivo, alterazione del comportamento, ecc) sulle aree prospicienti alle aree di occupazione del suolo dalle attività antropiche. Rappresenta quindi un impatto indiretto che può comportare un declino della densità di popolazione.
1	Effetti modesti. Non si riscontrano impatti indiretti e/o indiretti sulle componenti ambientali.

Ai fini della stima del valore di pressione causata dall'occupazione del suolo, si ritiene quanto segue:

Valore di pressione (G)	Motivazioni
Superficie potenziale complessiva di nuove aree sciabili: 3	Per semplificazione, consideriamo l'intera superficie potenziale di nuove aree sciabili idonea ad ospitare ciascuna singola specie. Per tale motivo nella superficie potenziale di nuove aree sciabili gli effetti indotti sulla fauna si ritengono gravi.
Area buffer: 2	Ipotizziamo una diminuzione della densità di popolazione per tutte le specie coinvolte per una superficie pari al doppio di quella potenziale complessiva per nuove aree sciabili. Pur essendo consapevoli che il "raggio di disturbo alla fauna" varia in funzione della fenologia e della capacità di adattamento all'uomo, non potendo individuare un "raggio di disturbo alla fauna" perché in questa fase di pianificazione non è possibile individuare la localizzazione delle nuove aree sciabili, l'area buffer la consideriamo



	quadrupla della superficie potenziale complessiva di nuove aree sciabili. Difatti, qualunque sia la forma e la dimensione delle nuove aree sciabili, le aree buffer ideate sono delle aree cuscinetto confinanti con le aree sciabili, entro le quali il disturbo provocato dalle attività antropiche non ha nessun effetto per nessuna specie animali presente.
--	--

P = VALORE DI VULNERABILITÀ SULLE SPECIE

I valori di vulnerabilità sulle specie, necessari per la valutazione della significatività dell'incidenza, sono quelli riportati nell'analisi della vulnerabilità.

Per le specie coinvolte, i valori di vulnerabilità sono quelli calcolati con il metodo di Storie-Villa, il quale assegna un giudizio di vulnerabilità secondo una scala di valori che va da 1 a 5

Vulnerabilità delle specie

<u>Punteggio</u>	<u>Dato qualitativo</u>
$1,00 \leq VuS < 2,00$	Bassa
$2,00 \leq VuS < 3,00$	Media
$3,00 \leq VuS < 4,00$	Alta
$4,00 \leq VuS \leq 5,00$	Molto Alta

Tabella: Classificazione della Vulnerabilità delle specie (VuS)

GIUDIZIO DI SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA

Per ciascuna componente ambientale coinvolta (specie faunistiche presenti), il giudizio di significatività attribuito alle azioni del piano si ottiene predisponendo un grafico che mette in relazione due fattori:

- la significatività dell'incidenza (S) quale prodotto tra la gravità dei fattori perturbativi (G) e il valore di vulnerabilità sugli habitat e le specie (P)

- Il rapporto percentuale (**R**) tra la superficie degli habitat di specie coinvolti dalle nuove aree sciabili e la superficie di tutti gli habitat di specie idonei ad ospitare la stessa specie presenti nel sito della Rete Natura 2000 coinvolto dall'ambito demaniale.

Il grafico seguente permette quindi di attribuire un giudizio di significatività dell'incidenza per ciascuna componente ambientale.




Fig.: Grafico per la stima del giudizio di significatività dell'incidenza sulle componenti ambientali coinvolte

Esempio applicativo:

specie Ermellino

$S = 6,47$

$R = 0,01\%$ (quale rapporto tra le superfici di tutti gli habitat di specie idonei ad ospitare la specie ma interessati dalle nuove aree sciabili, e la superficie di tutti gli habitat di specie idonei ad ospitare il Ermellino e presenti nel sito Natura 2000)

Giudizio di significatività = non significativo

Spiegazione = il punto di coordinate R ed S pari a 6,47 e 0,01% ricade nella fascia del “Non significativo”, per cui si ritiene che la significatività dell'incidenza delle azioni del piano per il Ermellino sia “Non significativo”.



Considerato il piano e le interferenze che esso può avere con l'ambiente, l'obiettivo della presente analisi è quello di valutare che si realizzino le condizioni necessarie a garantire **il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.**

Il concetto di **stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie** viene definito come segue:

Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio.

Lo «stato di conservazione» di un habitat naturale è considerato «soddisfacente» quando

- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,
- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile
- lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i).

Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio.

Lo «stato di conservazione» è considerato «soddisfacente» quando

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,
- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e
- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

Per cui i giudizi di significatività espressi secondo il grafico riportato tengono conto della stato di conservazione della specie e si ritiene quanto segue:

- **Non significativo:** le azioni del piano non sono tali da compromettere lo stato di conservazione delle specie e degli habitat



- **Basso:** le azioni del piano sono tali da compromettere lo stato di conservazione ma in maniera tale da prevedere un possibile ripristino dello stato di conservazione in tempi medio-brevi
- **Medio:** le azioni del piano sono tali da compromettere lo stato di conservazione ma in maniera tale da prevedere un possibile ripristino dello stato di conservazione in tempi medio-lunghi
- **Alto:** le azioni del piano sono tali da compromettere lo stato di conservazione in maniera irreversibile.

Analisi della significatività dell'incidenza alle specie coinvolte

Nome scientifico	P	G1	S1= G1xP	R1	G2	S2 = G2 x P	R2	Giudizio di significatività dell'incidenza
<i>Accipiter gentilis</i>	2,58	3	7,74	0,03	2	5,16	0,10	Non significativo
<i>Accipiter nisus</i>	2,58	3	7,74	0,03	2	5,16	0,10	Non significativo
<i>Aegithalos caudatus</i>	1,71	3	5,12	0,40	2	3,41	1,61	Non significativo
<i>Aegolius funereus</i>	1,71	3	5,12	0,04	2	3,41	0,15	Non significativo
<i>Alectoris graeca</i>	3,55	3	10,65	0,13	2	7,10	0,52	Non significativo
<i>Amblyotus nilssonii</i>	2,41	3	7,24	0,02	2	4,83	0,10	Non significativo
							38,8	
<i>Anas platyrhynchos</i>	1,00	3	3,00	9,70	2	2,00	0	Medio
<i>Anguis fragilis</i>	2,41	3	7,24	0,02	2	4,83	0,08	Non significativo
<i>Anthus campestris</i>	2,41	3	7,24	0,17	2	4,83	0,68	Non significativo
<i>Anthus spinoletta</i>	1,71	3	5,12	0,08	2	3,41	0,32	Non significativo
<i>Anthus trivialis</i>	1,71	3	5,12	0,03	2	3,41	0,10	Non significativo
<i>Apodemus alpicola</i>	1,00	3	3,00	0,03	2	2,00	0,12	Non significativo
<i>Apodemus flavicollis</i>	1,71	3	5,12	0,03	2	3,41	0,12	Non significativo
<i>Apodemus sylvaticus</i>	1,00	3	3,00	0,02	2	2,00	0,10	Non significativo
<i>Apus apus</i>	1,00	3	3,00	0,05	2	2,00	0,20	Non significativo
<i>Apus melba</i>	1,00	3	3,00	0,13	2	2,00	0,53	Non significativo
<i>Aquila chrysaetos</i>	3,55	3	10,65	0,02	2	7,10	0,08	Non significativo
<i>Asio otus</i>	2,58	3	7,74	0,03	2	5,16	0,12	Non significativo
<i>Athene noctua</i>	1,71	3	5,12	0,02	2	3,41	0,10	Non significativo
<i>Barbastella barbastellus</i>	1,71	3	5,12	0,03	2	3,41	0,10	Non significativo
<i>Bombina variegata</i>	3,55	3	10,65	0,02	2	7,10	0,10	Non significativo
<i>Bonasa bonasia</i>	2,58	3	7,74	0,04	2	5,16	0,15	Non significativo
<i>Bubo bubo</i>	1,71	3	5,12	0,03	2	3,41	0,11	Non significativo
<i>Bufo bufo</i>	1,71	3	5,12	0,02	2	3,41	0,10	Non significativo
<i>Bufo viridis</i>	2,41	3	7,24	0,02	2	4,83	0,10	Non significativo



<i>Buteo buteo</i>	2,41	3	7,24	0,03	2	4,83	0,10	Non significativo
<i>Capra ibex</i>	3,55	3	10,65	0,02	2	7,10	0,08	Non significativo
<i>Capreolus capreolus</i>	2,41	3	7,24	0,02	2	4,83	0,10	Non significativo
<i>Caprimulgus europaeus</i>	2,41	3	7,24	0,08	2	4,83	0,32	Non significativo
<i>Carduelis cannabina</i>	2,00	3	6,00	0,08	2	4,00	0,32	Non significativo
<i>Carduelis carduelis</i>	2,58	3	7,74	0,04	2	5,16	0,15	Non significativo
<i>Carduelis chloris</i>	2,00	3	6,00	0,04	2	4,00	0,15	Non significativo
<i>Carduelis flammea</i>	1,71	3	5,12	0,04	2	3,41	0,17	Non significativo
<i>Carduelis spinus</i>	1,71	3	5,12	0,04	2	3,41	0,14	Non significativo
<i>Certhia brachydactyla</i>	1,71	3	5,12	0,04	2	3,41	0,15	Non significativo
<i>Certhia familiaris</i>	1,71	3	5,12	0,04	2	3,41	0,16	Non significativo
<i>Charadrius morinellus</i>	3,55	3	10,65	0,08	2	7,10	0,34	Non significativo
<i>Chionomys nivalis</i>	1,71	3	5,12	0,05	2	3,41	0,21	Non significativo
<i>Clethrionomys glareolus</i>	1,00	3	3,00	0,03	2	2,00	0,10	Non significativo
<i>Coccothraustes</i>								
<i>coccothraustes</i>	2,58	3	7,74	0,04	2	5,16	0,15	Non significativo
<i>Coluber viridiflavus</i>	2,00	3	6,00	0,02	2	4,00	0,08	Non significativo
<i>Columba livia</i>	1,00	3	3,00	0,13	2	2,00	0,53	Non significativo
<i>Columba palumbus</i>	1,00	3	3,00	0,04	2	2,00	0,15	Non significativo
<i>Coronella austriaca</i>	2,41	3	7,24	0,02	2	4,83	0,08	Non significativo
<i>Corvus corax</i>	1,00	3	3,00	0,07	2	2,00	0,30	Non significativo
<i>Corvus corone</i>	1,00	3	3,00	0,03	2	2,00	0,12	Non significativo
<i>Corvus monedula</i>	2,00	3	6,00	0,03	2	4,00	0,12	Non significativo
<i>Coturnix coturnix</i>	2,58	3	7,74	0,08	2	5,16	0,32	Non significativo
<i>Crocidura leucodon</i>	1,00	3	3,00	0,02	2	2,00	0,10	Non significativo
<i>Crocidura suaveolens</i>	1,00	3	3,00	0,02	2	2,00	0,10	Non significativo
<i>Cuculus canorus</i>	2,58	3	7,74	0,04	2	5,16	0,15	Non significativo
<i>Delichon urbica</i>	2,58	3	7,74	0,13	2	5,16	0,52	Non significativo
<i>Dryocopus martius</i>	1,71	3	5,12	0,04	2	3,41	0,15	Non significativo
<i>Dryomys nitedula</i>	1,71	3	5,12	0,03	2	3,41	0,12	Non significativo
<i>Elaphe longissima</i>	1,00	3	3,00	0,02	2	2,00	0,08	Non significativo
<i>Eliomys quercinus</i>	2,00	3	6,00	0,03	2	4,00	0,10	Non significativo
<i>Emberiza cia</i>	2,00	3	6,00	0,05	2	4,00	0,20	Non significativo
<i>Emberiza citrinella</i>	1,00	3	3,00	0,08	2	2,00	0,32	Non significativo
<i>Emberiza hortulana</i>	3,55	3	10,65	0,17	2	7,10	0,68	Non significativo
<i>Eptesicus serotinus</i>	2,00	3	6,00	0,02	2	4,00	0,10	Non significativo
<i>Erinaceus concolor</i>	1,71	3	5,12	0,02	2	3,41	0,10	Non significativo
<i>Erinaceus europaeus</i>	1,71	3	5,12	0,02	2	3,41	0,10	Non significativo
<i>Erithacus rubecula</i>	1,00	3	3,00	0,04	2	2,00	0,15	Non significativo
<i>Falco peregrinus</i>	2,00	3	6,00	0,05	2	4,00	0,21	Non significativo
<i>Falco tinnunculus</i>	2,41	3	7,24	0,05	2	4,83	0,20	Non significativo
<i>Ficedula albicollis</i>	2,58	3	7,74	0,04	2	5,16	0,15	Non significativo
<i>Fringilla coelebs</i>	2,41	3	7,24	0,04	2	4,83	0,14	Non significativo



							36,6	
<i>Fulica atra</i>	1,71	3	5,12	9,15	2	3,41	0	Medio
							36,6	
<i>Gallinula chloropus</i>	1,71	3	5,12	9,15	2	3,41	0	Medio
<i>Garrulus glandarius</i>	1,71	3	5,12	0,04	2	3,41	0,15	Non significativo
<i>Glaucidium passerinum</i>	1,71	3	5,12	0,04	2	3,41	0,17	Non significativo
<i>Hirundo rustica</i>	1,71	3	5,12	0,05	2	3,41	0,20	Non significativo
<i>Hyla intermedia</i>	1,71	3	5,12	0,02	2	3,41	0,10	Non significativo
<i>Hypsugo savii</i>	2,00	3	6,00	0,02	2	4,00	0,10	Non significativo
<i>Jynx torquilla</i>	2,58	3	7,74	0,04	2	5,16	0,15	Non significativo
<i>Lacerta viridis</i>	1,71	3	5,12	0,02	2	3,41	0,08	Non significativo
<i>Lagopus mutus</i>								
<i>helveticus</i>	3,24	3	9,71	0,07	2	6,47	0,28	Non significativo
<i>Lanius collurio</i>	3,24	3	9,71	0,08	2	6,47	0,32	Non significativo
<i>Lepus europaeus</i>	2,58	3	7,74	0,06	2	5,16	0,24	Non significativo
<i>Lepus timidus</i>	2,41	3	7,24	0,02	2	4,83	0,09	Non significativo
<i>Loxia curvirostra</i>	1,71	3	5,12	0,04	2	3,41	0,16	Non significativo
<i>Lullula arborea</i>	2,58	3	7,74	0,08	2	5,16	0,32	Non significativo
<i>Luscinia megarhynchos</i>	3,00	3	9,00	0,04	2	6,00	0,14	Non significativo
<i>Lynx lynx</i>	3,55	3	10,65	0,02	2	7,10	0,08	Non significativo
<i>Marmota marmota</i>	2,41	3	7,24	0,02	2	4,83	0,08	Non significativo
<i>Martes foina</i>	2,58	3	7,74	0,02	2	5,16	0,08	Non significativo
<i>Martes martes</i>	3,00	3	9,00	0,03	2	6,00	0,10	Non significativo
<i>Meles meles</i>	2,58	3	7,74	0,02	2	5,16	0,10	Non significativo
<i>Microtus agrestis</i>	1,00	3	3,00	0,02	2	2,00	0,10	Non significativo
<i>Microtus arvalis</i>	1,00	3	3,00	0,08	2	2,00	0,32	Non significativo
<i>Microtus multiplex</i>	2,58	3	7,74	0,02	2	5,16	0,10	Non significativo
<i>Microtus savii</i>	1,00	3	3,00	0,03	2	2,00	0,12	Non significativo
<i>Microtus subterraneus</i>	1,00	3	3,00	0,02	2	2,00	0,10	Non significativo
<i>Milvus migrans</i>	3,55	3	10,65	0,06	2	7,10	0,24	Non significativo
<i>Miniopterus schreibersi</i>	2,41	3	7,24	0,05	2	4,83	0,20	Non significativo
<i>Monticola saxatilis</i>	1,71	3	5,12	0,05	2	3,41	0,20	Non significativo
<i>Monticola solitarius</i>	1,71	3	5,12	0,07	2	3,41	0,28	Non significativo
<i>Montifringilla nivalis</i>	1,71	3	5,12	0,13	2	3,41	0,52	Non significativo
							31,6	
<i>Motacilla alba</i>	1,71	3	5,12	7,91	2	3,41	3	Medio
<i>Motacilla cinerea</i>	1,71	3	5,12	0,13	2	3,41	0,52	Non significativo
<i>Mus domesticus</i>	1,00	3	3,00	0,08	2	2,00	0,33	Non significativo
<i>Muscardinus avellanarius</i>	2,58	3	7,74	0,03	2	5,16	0,10	Non significativo
<i>Muscicapa striata</i>	1,71	3	5,12	0,03	2	3,41	0,10	Non significativo
<i>Mustela erminea</i>	2,58	3	7,74	0,02	2	5,16	0,08	Non significativo
<i>Mustela nivalis</i>	2,58	3	7,74	0,02	2	5,16	0,09	Non significativo
<i>Mustela putorius</i>	3,00	3	9,00	0,03	2	6,00	0,10	Non significativo



<i>Myotis bechsteini</i>	2,00	3	6,00	0,04	2	4,00	0,15	Non significativo
<i>Myotis brandti</i>	2,00	3	6,00	0,04	2	4,00	0,14	Non significativo
<i>Myotis daubentoni</i>	2,00	3	6,00	0,06	2	4,00	0,26	Non significativo
<i>Myotis emarginatus</i>	2,00	3	6,00	0,04	2	4,00	0,14	Non significativo
<i>Myotis myotis</i>	2,00	3	6,00	0,02	2	4,00	0,10	Non significativo
<i>Myotis mystacinus</i>	2,00	3	6,00	0,03	2	4,00	0,10	Non significativo
<i>Myotis nattereri</i>	2,00	3	6,00	0,04	2	4,00	0,14	Non significativo
<i>Natrix natrix</i>	2,41	3	7,24	0,02	2	4,83	0,08	Non significativo
<i>Natrix tessellata</i>	2,41	3	7,24	0,02	2	4,83	0,08	Non significativo
<i>Neomys anomalus</i>	1,71	3	5,12	0,02	2	3,41	0,10	Non significativo
<i>Neomys fodiens</i>	1,00	3	3,00	0,02	2	2,00	0,10	Non significativo
<i>Nucifraga caryocatactes</i>	1,71	3	5,12	0,04	2	3,41	0,17	Non significativo
<i>Nyctalus lasiopterus</i>	1,71	3	5,12	0,02	2	3,41	0,10	Non significativo
<i>Nyctalus leisleri</i>	2,00	3	6,00	0,03	2	4,00	0,12	Non significativo
<i>Nyctalus noctula</i>	2,00	3	6,00	0,03	2	4,00	0,10	Non significativo
<i>Oenanthe oenanthe</i>	2,00	3	6,00	0,05	2	4,00	0,20	Non significativo
<i>Oriolus oriolus</i>	2,41	3	7,24	0,40	2	4,83	1,61	Non significativo
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	2,58	3	7,74	0,06	2	5,16	0,24	Non significativo
<i>Otus scops</i>	2,58	3	7,74	0,03	2	5,16	0,11	Non significativo
<i>Ovis orientalis</i>	3,24	3	9,71	0,02	2	6,47	0,08	Non significativo
<i>Parus ater</i>	2,41	3	7,24	0,04	2	4,83	0,15	Non significativo
<i>Parus caeruleus</i>	1,00	3	3,00	0,04	2	2,00	0,15	Non significativo
<i>Parus cristatus</i>	2,00	3	6,00	0,04	2	4,00	0,16	Non significativo
<i>Parus major</i>	1,71	3	5,12	0,04	2	3,41	0,15	Non significativo
<i>Parus montanus</i>	2,00	3	6,00	0,04	2	4,00	0,16	Non significativo
<i>Parus palustris</i>	1,71	3	5,12	0,04	2	3,41	0,15	Non significativo
<i>Passer domesticus</i>	2,00	3	6,00	0,40	2	4,00	1,61	Non significativo
<i>Passer italiae</i>	2,00	3	6,00	0,40	2	4,00	1,61	Non significativo
<i>Passer montanus</i>	1,00	3	3,00	0,40	2	2,00	1,61	Non significativo
<i>Perdix perdix</i>	1,71	3	5,12	0,08	2	3,41	0,32	Non significativo
<i>Pernis apivorus</i>	2,58	3	7,74	0,03	2	5,16	0,11	Non significativo
<i>Phasianus colchicus</i>	1,00	3	3,00	0,08	2	2,00	0,32	Non significativo
<i>Phoenicurus ochruros</i>	2,00	3	6,00	0,05	2	4,00	0,21	Non significativo
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	2,00	3	6,00	0,04	2	4,00	0,15	Non significativo
<i>Phylloscopus bonelli</i>	1,71	3	5,12	0,04	2	3,41	0,15	Non significativo
<i>Phylloscopus collybita</i>	2,58	3	7,74	0,04	2	5,16	0,14	Non significativo
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	2,41	3	7,24	0,26	2	4,83	1,04	Non significativo
<i>Pica pica</i>	1,00	3	3,00	0,02	2	2,00	0,10	Non significativo
<i>Picoides leucotos</i>	1,71	3	5,12	0,40	2	3,41	1,61	Non significativo
<i>Picoides major</i>	2,58	3	7,74	0,04	2	5,16	0,15	Non significativo
<i>Picoides minor</i>	2,00	3	6,00	0,40	2	4,00	1,61	Non significativo
<i>Picoides tridactylus</i>	3,55	3	10,65	0,04	2	7,10	0,17	Non significativo
<i>Picus canus</i>	3,55	3	10,65	0,04	2	7,10	0,15	Non significativo



<i>Picus viridis</i>	2,00	3	6,00	0,04	2	4,00	0,15	Non significativo
<i>Pipistrellus kuhli</i>	2,58	3	7,74	0,03	2	5,16	0,10	Non significativo
<i>Pipistrellus nathusii</i>	2,58	3	7,74	0,03	2	5,16	0,12	Non significativo
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	2,00	3	6,00	0,03	2	4,00	0,10	Non significativo
<i>Plecotus auritus</i>	2,00	3	6,00	0,03	2	4,00	0,12	Non significativo
<i>Podarcis muralis</i>	1,00	3	3,00	0,02	2	2,00	0,08	Non significativo
<i>Prunella collaris</i>	1,71	3	5,12	0,05	2	3,41	0,21	Non significativo
<i>Prunella modularis</i>	1,71	3	5,12	0,03	2	3,41	0,12	Non significativo
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	1,71	3	5,12	0,13	2	3,41	0,52	Non significativo
<i>Pyrrhocorax graculus</i>	1,00	3	3,00	0,13	2	2,00	0,53	Non significativo
<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	1,00	3	3,00	0,13	2	2,00	0,52	Non significativo
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	2,00	3	6,00	0,04	2	4,00	0,15	Non significativo
<i>Rana dalmatina</i>	1,71	3	5,12	0,02	2	3,41	0,10	Non significativo
<i>Rana synklepton</i>								
<i>esculenta</i>	1,71	3	5,12	0,02	2	3,41	0,10	Non significativo
<i>Rana temporaria</i>	1,71	3	5,12	0,02	2	3,41	0,10	Non significativo
<i>Rattus norvegicus</i>	1,00	3	3,00	0,03	2	2,00	0,11	Non significativo
<i>Rattus rattus</i>	1,00	3	3,00	0,02	2	2,00	0,10	Non significativo
<i>Regulus ignicapillus</i>	2,00	3	6,00	0,04	2	4,00	0,15	Non significativo
<i>Regulus regulus</i>	2,00	3	6,00	0,04	2	4,00	0,15	Non significativo
<i>Rhinolophus</i>								
<i>ferrumequinum</i>	1,71	3	5,12	0,04	2	3,41	0,15	Non significativo
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	2,00	3	6,00	0,03	2	4,00	0,10	Non significativo
<i>Rhinolophus mehelyi</i>	2,00	3	6,00	0,04	2	4,00	0,15	Non significativo
<i>Rupicapra rupicapra</i>	3,55	3	10,65	0,02	2	7,10	0,08	Non significativo
<i>Salamandra atra</i>	2,00	3	6,00	0,02	2	4,00	0,10	Non significativo
<i>Salamandra lanzai</i>	3,00	3	9,00	0,02	2	6,00	0,08	Non significativo
<i>Salamandra salamandra</i>	4,00	3	12,00	0,02	2	8,00	0,10	Non significativo
<i>Saxicola rubetra</i>	1,71	3	5,12	0,08	2	3,41	0,32	Non significativo
<i>Saxicola torquata</i>	1,71	3	5,12	0,08	2	3,41	0,32	Non significativo
<i>Sciurus vulgaris</i>	2,00	3	6,00	0,04	2	4,00	0,15	Non significativo
<i>Scolopax rusticola</i>	2,58	3	7,74	0,02	2	5,16	0,10	Non significativo
<i>Serinus citrinella</i>	1,00	3	3,00	0,04	2	2,00	0,15	Non significativo
<i>Serinus serinus</i>	2,58	3	7,74	0,04	2	5,16	0,15	Non significativo
<i>Sitta europaea</i>	2,00	3	6,00	0,04	2	4,00	0,15	Non significativo
<i>Sorex alpinus</i>	1,00	3	3,00	0,03	2	2,00	0,10	Non significativo
<i>Sorex araneus</i>	2,41	3	7,24	0,02	2	4,83	0,10	Non significativo
<i>Sorex minutus</i>	2,41	3	7,24	0,02	2	4,83	0,10	Non significativo
<i>Speleomantes ambrosii</i>	2,00	3	6,00	0,02	2	4,00	0,08	Non significativo
<i>Streptopelia turtur</i>	1,00	3	3,00	0,26	2	2,00	1,04	Non significativo
<i>Strix aluco</i>	2,58	3	7,74	0,26	2	5,16	1,04	Non significativo
<i>Sturnus vulgaris</i>	1,00	3	3,00	1,20	2	2,00	4,80	Non significativo
<i>Sus scrofa</i>	3,00	3	9,00	0,02	2	6,00	0,10	Non significativo



<i>Sylvia atricapilla</i>	2,58	3	7,74	0,04	2	5,16	0,14	Non significativo
<i>Sylvia borin</i>	2,58	3	7,74	0,04	2	5,16	0,15	Non significativo
<i>Sylvia communis</i>	2,00	3	6,00	0,15	2	4,00	0,59	Non significativo
<i>Sylvia conspicillata</i>	2,00	3	6,00	0,20	2	4,00	0,80	Non significativo
<i>Sylvia curruca</i>	2,00	3	6,00	0,03	2	4,00	0,11	Non significativo
<i>Sylvia melanocephala</i>	2,58	3	7,74	0,11	2	5,16	0,43	Non significativo
<i>Sylvia nisoria</i>	2,00	3	6,00	0,39	2	4,00	1,56	Non significativo
<i>Tadarida teniotis</i>	2,00	3	6,00	0,13	2	4,00	0,51	Non significativo
<i>Talpa caeca</i>	1,00	3	3,00	0,02	2	2,00	0,10	Non significativo
<i>Talpa europaea</i>	1,00	3	3,00	0,02	2	2,00	0,10	Non significativo
<i>Talpa romana</i>	1,00	3	3,00	0,02	2	2,00	0,10	Non significativo
<i>Tetrao tetrix tetrix</i>	2,00	3	6,00	0,03	2	4,00	0,12	Non significativo
<i>Tetrao urogallus</i>	3,00	3	9,00	0,04	2	6,00	0,15	Non significativo
<i>Tichodroma muraria</i>	2,00	3	6,00	0,13	2	4,00	0,53	Non significativo
<i>Triturus alpestris</i>	2,00	3	6,00	0,02	2	4,00	0,10	Non significativo
<i>Triturus carnifex</i>	2,00	3	6,00	0,02	2	4,00	0,10	Non significativo
<i>Triturus vulgaris</i>	1,71	3	5,12	0,02	2	3,41	0,10	Non significativo
<i>Troglodytes troglodytes</i>	1,71	3	5,12	0,04	2	3,41	0,15	Non significativo
<i>Turdus merula</i>	1,00	3	3,00	0,03	2	2,00	0,12	Non significativo
<i>Turdus philomelos</i>	2,58	3	7,74	0,03	2	5,16	0,12	Non significativo
<i>Turdus pilaris</i>	1,71	3	5,12	0,04	2	3,41	0,15	Non significativo
<i>Turdus torquatus</i>	1,71	3	5,12	0,03	2	3,41	0,11	Non significativo
<i>Turdus viscivorus</i>	2,00	3	6,00	0,04	2	4,00	0,15	Non significativo
<i>Tyto alba</i>	2,58	3	7,74	1,21	2	5,16	4,85	Non significativo
<i>Upupa epops</i>	3,00	3	9,00	0,26	2	6,00	1,04	Non significativo
<i>Ursus arctos</i>	4,00	3	12,00	0,02	2	8,00	0,08	Non significativo
<i>Vanellus vanellus</i>	2,58	3	7,74	0,13	2	5,16	0,52	Non significativo
<i>Vespertilio murinus</i>	1,00	3	3,00	0,04	2	2,00	0,14	Non significativo
<i>Vipera ammodytes</i>	2,58	3	7,74	0,02	2	5,16	0,08	Non significativo
<i>Vipera aspis</i>	1,00	3	3,00	0,02	2	2,00	0,08	Non significativo
<i>Vipera berus</i>	3,55	3	10,65	0,02	2	7,10	0,08	Non significativo
<i>Vulpes vulpes</i>	2,58	3	7,74	0,02	2	5,16	0,10	Non significativo
					2,0			
<i>Zootoca vivipara</i>	2,00	3	6,00	0,02	0	4	0,08	Non significativo

Dove:

G1 = valori di pressione (gravità) del fattore perturbativo occupazione del suolo nella superficie potenziale complessiva di nuove aree sciabili

G2 = valori di pressione (gravità) del fattore perturbativo occupazione del suolo nell'area buffer

P = valore di vulnerabilità sulle specie

S1-2 = significatività dell'incidenza ($S1=G1 \times P$), ($S2=G2 \times P$)

R1 = Il rapporto percentuale (**R**) tra la superficie degli habitat di specie coinvolti nella superficie potenziale complessiva di nuove aree sciabili e la superficie di tutti gli habitat di specie idonei ad ospitare la stessa specie presenti nel sito della Rete Natura 2000 coinvolto dall'ambito demaniale.



R1 = Il rapporto percentuale (**R**) tra la superficie degli habitat di specie coinvolti nell'area buffer e la superficie di tutti gli habitat di specie idonei ad ospitare la stessa specie presenti nel sito della Rete Natura 2000 coinvolto dall'ambito demaniale.

Giudizio di significatività dell'incidenza = Il giudizio di significatività attribuito a ciascuna specie è dato dalla combinazione (S1-R1, S2-R2) che esprime la condizione peggiore.

Valutazione della significatività dell'incidenza con riferimento agli habitat coinvolti

Il metodo che si propone per la valutazione della significatività dell'incidenza con riferimento agli habitat comunitari coinvolti deriva dalla esperienza della Program s.r.l., la quale è consolidata negli anni e collaudata in molteplici valutazioni similari a questa. Questo metodo inoltre si basa su considerazioni logiche le quali possono essere facilmente dimostrabili e riconoscibili da chiunque.

All'interno dell'ambito sciistico si trovano degli habitat comunitari che potrebbero essere direttamente e/o indirettamente coinvolti dalle azioni del piano, in quanto la realizzazione di nuove aree sciabili potrebbe occupare superfici di habitat a disposizione delle biocenosi, e che una volta occupati concorrono alla diminuzione e alla perdita di habitat naturali.

Le norme tecniche e le norme di intervento ambientale del Piano Regionale Neve (post – 2007) prevedono la tutela e la conservazione degli habitat comunitari prioritari, tuttavia, in ciascun ambito sciistico possono verificarsi dei casi per i quali non è possibile rispettare quanto prescritto.

Nella tabella di seguito riportata si individuano i casi possibili con i relativi giudizi di significatività dell'incidenza e relativo motivo.

Superficie potenziale complessiva di nuove aree sciabili (S)		Giudizio di significatività dell'incidenza	Motivazione
Caso 1	S < Area fuori dal sito Natura 2000 (A)	Non significativo	È possibile realizzare l'intera superficie potenziale di nuove aree sciabili senza interessare il sito Natura 2000 ne tanto meno gli habitat comunitari.
Caso 2	A < S < A + Habitat non	Non significativo	È possibile realizzare l'intera superficie potenziale di nuove aree sciabili senza interessare gli habitat



	comunitari (HNC)		comunitari presenti nell'ambito sciistico.
Caso 3	$A + HNC < S < A + HNC + \text{Habitat comunitari non prioritari (HC)}$	Ulteriore verifica	Nonostante sia possibile realizzare l'intera superficie potenziale complessiva di nuove aree sciabili senza interessare habitat comunitari prioritari presenti nell'ambito sciistico, non si può escludere la possibilità che si verificano delle incidenze significativamente negative di tipo indiretto sugli habitat comunitari prioritari stessi.
Caso 4	$A + HNC + HC < S \leq A + HNC + HC + \text{Habitat comunitari prioritari (HP)}$	Significativo	Poiché non è possibile realizzare l'intera superficie potenziale complessiva di nuove aree sciabili senza interessare gli habitat comunitario prioritari presenti nel demanio sciabile, si ritiene che in questo caso l'incidenza delle azioni del piano siano significativamente negative

Ulteriore verifica del caso 3

Per valutare la significatività delle incidenze del piano per il caso 3, ovvero nella situazione in cui la superficie potenziale di nuove aree sciabili è maggiore della somma tra l'area fuori del Sito Natura 2000 e l'area degli habitat non comunitari presenti nell'ambito sciistico, per cui almeno parzialmente le nuove aree sciabili andranno ad interessare anche gli habitat comunitari non prioritari, in tal caso non si può escludere il verificarsi di effetti significativamente negativi diretti e indiretti sugli habitat comunitari presenti. Non avendo a disposizione conoscenze di maggior dettaglio che dovranno essere acquisite, con crescente precisione, in fase di progettazione degli interventi, si ritiene opportuno e sufficiente per questa fase di pianificazione applicare un indicatore di concentrazione di habitat comunitari nell'area in esame.

Si calcola il rapporto percentuale **R1** per il demanio sciistico e il rapporto percentuale **R2** per il sito della Rete Natura 2000 coinvolto:

$$\mathbf{R1} = (\text{Superficie habitat comunitari prioritari coinvolti nel demanio sciistico} / \text{Superficie habitat comunitari non prioritari coinvolti nel demanio sciistico}) * 100$$



$R2 = (\text{Superficie habitat comunitari non prioritari presenti nel Sito Natura 2000} / \text{Superficie habitat comunitari non prioritari presenti nel Sito Natura 2000}) * 100$

Per cui

		Giudizio di significatività dell'incidenza	Motivazione
Caso 3.1	$R1 \geq R2$	Significativo	Il demanio sciabile è localizzato in un'area coinvolta dal sito Natura 2000 nel quale c'è una maggiore concentrazione di habitat comunitari prioritari rispetto alla rimanente area del Sito Natura 2000 . In questa fattispecie non si ritiene che le norme del PRN siano sufficienti a tutelare gli habitat comunitari.
Caso 3.2	$R1 < R2$	Non significativo	Il demanio sciabile è localizzato in un'area coinvolta dal sito Natura 2000 nel quale c'è una minore concentrazione di habitat comunitari prioritari rispetto al rimanente area del Sito Natura 2000. Data la non particolare concentrazione di habitat comunitari prioritari si ritiene che le norme del PRN siano sufficienti a tutelare gli habitat comunitari prioritari presenti.

Con questa analisi il giudizio di significatività dell'incidenza in seguito alle azioni del piano verrà attribuito indistintamente a tutti gli habitat comunitari coinvolti, in quanto in questo livello di pianificazione non è possibile distinguere quali siano e quali non siano coinvolti.

**Analisi della significatività dell'incidenza agli habitat coinvolti dall'ambito sciistico A04****Monte Ferro**

Superficie sciistica A04 Monte Ferro	Ambito	379,98 ha	Superficie potenziale di nuove aree sciabili (S)	50,27 ha
Area fuori dal Sito Natura 2000 compresa nell'ambito sciistico (A)	Habitat comunitari nell'ambito (HNC)	Habitat non presenti sciistico	Habitat comunitari presenti nell'ambito sciistico (HC)	Habitat comunitari prioritari presenti nell'ambito sciistico (HP)
8,82 ha		75,60 ha	279,53 ha	16,03 ha
A = 8,82 ha				
	A + HNC = 84,42 ha			
			A + HNC + HC =	
			363,95 ha	
				A + HNC + HC + HP = 379,98 ha

È possibile realizzare l'intera superficie potenziale di nuove aree sciabili senza interessare gli habitat comunitari presenti nell'ambito sciistico, in quanto la superficie potenziale di nuove aree sciabili è minore della superficie di habitat comunitari e habitat comunitari prioritari, per cui la situazione in esame ricade nel caso 2. Per tale motivo si ritiene che il Piano Regionale Neve (post 2007) per l'ambito sciistico A04 Monte Ferro non manifesta incidenze significativamente negative sugli habitat comunitari presenti.



FASE 4: SOLUZIONE ALTERNATIVA DUE

DATI IDENTIFICATIVI DEL PIANO, PROGETTO INTERVENTO
Descrizione Piano, Progetto o Intervento
<p>Nel seguente documento è stata analizzata la soluzione alternativa due: “Piano Regionale Neve (Piano Contro dedotto, post 2007)” per il demanio sciabile A04 Monte Ferro.</p> <p>Il Piano Regionale Neve (Piano Contro dedotto) si distingue dal Piano degli interventi (Piano pre – adottato) per due aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none">– l'introduzione di norme tecniche– l'individuazione di demani sciabili definiti aree “contenitore” entro le quali sono possono essere presenti delle infrastrutture sciistiche e si potranno sviluppare nuove infrastrutture per lo sport sulla neve rispettando gli incrementi di sviluppo imposti dal Piano Neve per ciascun ambito
Codice e denominazione dei siti Natura 2000 interessati
ZPS IT3230089 – Dolomiti del Cadore e del Comelico
Indicazione di altri piani, progetti o interventi che possano dare effetti combinati
<ul style="list-style-type: none">• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Belluno• Piano Regolatore Generale del comune di Sappada. Norme tecniche di attuazione
VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA' DEGLI EFFETTI
Descrizione di come il piano, progetto o intervento (da solo o per azione combinata) incida o non incida negativamente sui siti della rete Natura 2000
<p>L'analisi delle azioni di piano evidenzia come il PRN non determini interferenze sull'avifauna, non riducendo la disponibilità di aree per la pastura, né producendo effetti significativi di inquinamento acustico, atmosferico o luminoso. Sono pure assenti effetti sinergici.</p> <p>Alcune misure di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali possono incidere positivamente sul sistema ambientale, risultando coerenti con gli indirizzi di gestione formulati dalla Regione Veneto e favorendo quindi il mantenimento della biodiversità vegetazionale e faunistica che connota in misura notevolissima gli ambienti del Comelico.</p> <p>Pertanto il piano non incide negativamente sui siti Natura 2000.</p>

**Consultazione con gli Organi e Enti competenti e risultati della consultazione**

Nel corso della procedura di VINCA per il PRN sono state consultate le autorità ambientali, enti e associazioni. E' emersa una sostanziale concordanza fra obiettivi e criteri di tutela e scelte effettuate.

Dati raccolti per l'elaborazione dell'idonea valutazione

<i>Responsabili della verifica</i>	<i>Fonte dei dati</i>	<i>Livello di completezza delle informazioni</i>	<i>Luogo dove possono essere reperiti e visionati i dati utilizzati</i>
Dott. For. Graziano Martello	<ul style="list-style-type: none"> • Schede SIC Normativa Natura 2000; • Cartografia tecnica attuale e storica; • Cartografia dell'uso del suolo e strumenti di pianificazione; • Ricerche storiche; • Indagini sul sito 	Sufficiente	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Regione del Veneto; Provincia di Belluno; Comune di Sappada.

Tabella di valutazione riassuntiva**ZPS IT3230089 – Dolomiti del Cadore e del Comelico**

Habitat / Specie		Presenza nell'area oggetto di valutazione	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
Cod.	Nome				
9530*	Pinete (sub) – mediterranee di pini neri endemici	No	Nulla	Nulla	No
9420	Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus Cembra	Si	Non significativa	Non significativa	No
9410	Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Pioceetea)	Si	Non significativa	Non significativa	No
9180* ^o	Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion	No	Nulla	Nulla	No



9150	Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-Fagion	No	Nulla	Nulla	No
9130	Faggeti dell'Asperulo-Fagetum	No	Nulla	Nulla	No
91D0*	Torbiere boschive	No	Nulla	Nulla	No
8240*	Pavimenti calcarei	No	Nulla	Nulla	No
8220	Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica	No	Nulla	Nulla	No
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	Si	Non significativa	Non significativa	No
8120	Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)	Si	Non significativa	Non significativa	No
8110	Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani)	Si	Non significativa	Non significativa	No
7240	Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-Astrosfuscae	No	No	No	No
7230	Torbiere basse alcaline	Si	Non significativa	Non significativa	No
7150	Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion	No	No	No	No
7140	Torbiere di transizione e instabili	No	No	No	No
7110*	Torbiere alte attive	No	No	No	No
6520	Praterie montane del fieno	Si	Non significativa	Non significativa	No
6510	Praterie montane da fieno	No	No	No	No
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	No	Nulla	Nulla	No
6410	Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argillosi-limosi (Molinion caeruleae)	No	Nulla	Nulla	No
6230	Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)	No	Nulla	Nulla	No



6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies cespugliate su substrato calcareo (festuca-brometalia) (Stupenda fioritura di orchidee)	No	Nulla	Nulla	No
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine	Si	Non significativa	Non significativa	No
6150	Formazioni erbose boreo-alpine silicee	Si	Non significativa	Non significativa	No
4080	Boscaglie subartiche di Salix spp.	No	Nulla	Nulla	No
4070*	Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododretum hirsuti)	Si	Non significativa	Non significativa	No
4060	Lande alpine e boreali	Si	Non significativa	Non significativa	No
3240°	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos	Si	Non significativa	Non significativa	No
3230	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica	No	Nulla	Nulla	No
3220°	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea	No	Nulla	Nulla	No
Uccelli (Specie non elencate nell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE)					
	<i>Accipiter nisus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Pyrhcorax graculus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Turdus torquatus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
Uccelli (Specie elencate nell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE)					
	<i>Aegolius funereus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Alectoris graeca saxatilis</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Aquila chrysaetos</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Bonasa bonasia</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Bubo bubo</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Charadrius morinellus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Crex crex</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Dryocopus martius</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Falco peregrinus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Gyps fulvus</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Glaucidium passerinum</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Lagopus mutus helveticus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Milvus migrans</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Pernis apivorus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Picoides tridactylus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No



	<i>alpinus</i>				
	<i>Picus canus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Tetrao tetrix tetrix</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Tetrao urogallus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
Mammiferi (Specie elencate nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE)					
	<i>Lynx lynx</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Ursus arctos*</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
altre specie importanti					
	<i>Apodemus flavicollis</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Capra ibex</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Cervus elaphus</i>	No	Nulla	Nulla	No
	<i>Clethrionomys glareolus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Dryomis nitedula</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Lepus timidus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Martes martes</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Mustela erminea</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Neomys anomalus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Rupicapra rupicapra</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Sorex araneus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Sorex minutus</i>	No	Nulla	Nulla	No
Rettili (Specie elencate nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE)					
altre specie importanti					
	<i>Anguis fragilis</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Coronella austriaca</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Vipera berus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Zootoca vivipara</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
Anfibi (Specie elencate nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE)					
	<i>Bombina variegata</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
altre specie importanti					
	<i>Bufo bufo</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Rana temporaria</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Salamandra atra</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Triturus alpestris</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
Pesci (Specie elencate nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE)					
altre specie importanti					
Invertebrati (Specie elencate nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE)					
	<i>Erebia calcaria</i>	No	Nulla	Nulla	No
Piante (Specie elencate nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE)					
	<i>Cypripedium calceolus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
altre specie importanti					
	<i>Andromeda polifolia</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Arenaria huteri</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Campylyium stellatum</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Carex chordorrhiza</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Carex diandra</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Carex dioica</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Carex lasiocarpa</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Carex limosa</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Carex pauciflora</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Carex rostrata</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No



	<i>Cystopteris sudetica</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Drepanocladus revolvens</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Doronicum austriacum</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Drosera longifolia</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Drosera x obovata</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Drosera rotundifolia</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Equisetum pratense</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Erigeron atticus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Eritrichium nanum</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Euphrasia portae</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Fissidens adianthoides</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Gentiana froelichii</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Gentiana prostata</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Jovibarba arenaria</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Kobresia simpliciuscula</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Leontodon berinii</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Lomatogonium</i>				
	<i>carinthiacum</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Menyanthes trifoliata</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Montia fontana</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Potentilla nitida</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Potentilla palustris</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Primula wulfeniana</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Prunus padus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Ranunculus parnassifolius</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Rhynchospora alba</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Salix pentandra</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Saponaria pumila</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Scheuchzeria palustris</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Schoenus ferrugineus</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Scorzonera humilis</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Sempervivum wulfenii</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Spiraea decumbens ssp.</i>				
	<i>Tomentosa</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Swertia pennis</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Tofieldia pusilla</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Triglochin palustre</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Utricularia minor</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Vaccinium microcarpum</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No
	<i>Vaccinium oxycoccos</i>	Si	Non significativa	Non significativa	No

**Esito della valutazione appropriata**

In base alle analisi condotte si può affermare che la soluzione due: “Piano Regionale Neve (Piano Contro dedotto, post 2007)” per il demanio sciabile A04 Monte Ferro (da solo o per azione combinata) **non determinerà effetti negativi** a carico delle specie animali e vegetali dei siti **ZPS IT3230089** Dolomiti del Cadore e Comelico, né a carico degli habitat costituenti la Rete Natura 2000, né interferirà in alcun modo con le misure di conservazione dei siti.

“Con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”.



Dichiarazione firmata del professionista	
Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.	
Firma del professionista	Secondo quanto disposto dalla DGR n 3173 del 10 ottobre 2006, ai sensi e per gli effetti del DPR n 445/2000, il sottoscritto Dott. For. Graziano Martello , incaricato della redazione della valutazione d'incidenza ambientale per il PRN della Regione Veneto dichiara di essere in possesso della esperienza specifica e delle competenze in campo biologico, naturalistico ed ambientale necessarie per la corretta ed esaustiva redazione di valutazioni di incidenza, in relazione al progetto/piano/intervento trattato.
Noventa Padovana, li xx.xx.xxxx	Il Professionista _____

Noventa Padovana, li xx.xx.xxxx

Il Progettista_____
Il Committente

